



# CIÊNCIAS DA SAÚDE: ESTUDOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA VIDA

VOLUME XIII

Frederico Celestino Barbosa

Ciências da saúde: estudos para manutenção e melhoria da vida

13<sup>a</sup> ed.

Piracanjuba-GO  
Editora Conhecimento Livre  
Piracanjuba-GO

13ª ed.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

Barbosa, Frederico Celestino  
B238C Ciências da saúde: estudos para manutenção e melhoria da vida  
/ Frederico Celestino Barbosa. – Piracanjuba-GO

Editora Conhecimento Livre, 2024

140 f.: il

**DOI:** 10.37423/2024.edcl1032

**ISBN:** 978-65-5367-587-2

Modo de acesso: World Wide Web

Incluir Bibliografia

1. equipe 2. prevenção 3. tratamento 4. diagnóstico 5. prognóstico I. Barbosa, Frederico Celestino II.  
Título

CDU: 613

<https://doi.org/10.37423/2024.edcl1032>

**O conteúdo dos artigos e sua correção ortográfica são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.**

# EDITORIA CONHECIMENTO LIVRE

## Corpo Editorial

MSc Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior

MSc Humberto Costa

MSc Thays Merçon

MSc Adalberto Zorzo

MSc Taiane Aparecida Ribeiro Nepomoceno

PHD Willian Douglas Guilherme

MSc Andrea Carla Agnes e Silva Pinto

Dr. Walmir Fernandes Pereira

MSc Edisio Alves de Aguiar Junior

MSc Rodrigo Sanchotene Silva

MSc Adriano Pereira da Silva

MSc Frederico Celestino Barbosa

MSc Guilherme Fernando Ribeiro

MSc. Plínio Ferreira Pires

MSc Fabricio Vieira Cavalcante

PHD Marcus Fernando da Silva Praxedes

MSc Simone Buchignani Maigret

Dr. Adilson Tadeu Basquerote

Dra. Thays Zigante Furlan

MSc Camila Concato

PHD Miguel Adriano Inácio

Dra. Anelisa Mota Gregoleti

PHD Jesus Rodrigues Lemos

MSc Gabriela Cristina Borborema Bozzo

MSc Karine Moreira Gomes Sales

Dr. Saulo Cerqueira de Aguiar Soares

MSc Pedro Panhoca da Silva

MSc Helton Rangel Coutinho Junior

MSc Carlos Augusto Zilli

MSc Euvaldo de Sousa Costa Junior

Dra. Suely Lopes de Azevedo

Dr. Francisco Odecio Sales

MSc Ezequiel Martins Ferreira

MSc Eliane Avelina de Azevedo Sampaio

MSc Carlos Eduardo De Oliveira Gontijo

Dr. Rodrigo Couto Santos

Dra. Milena Gaion Malosso

PHD Marcos Pereira Dos Santos

|                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CAPÍTULO 1 .....</b>                                                                                    | <b>6</b>      |
| RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES CARDIOPATAS INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA                     |               |
| LUANA CARVALHO DOS SANTOS                                                                                  |               |
| CAROLINE TAVARES DA SILVA TORRES                                                                           |               |
| ERIKA MEIRE DOS SANTOS MARTINS                                                                             |               |
| ROBSON EDUARDO DA SILVA ARAUJO                                                                             |               |
| SIMONE MAYANE MENDES DOS SANTOS                                                                            |               |
| RENATA DE SOUSA GOMES PORTELA                                                                              |               |
| <b>DOI 10.37423/241109440</b>                                                                              |               |
| <br><b>CAPÍTULO 2 .....</b>                                                                                | <br><b>14</b> |
| APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM À LUZ DA TEORIA DA ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY À PESSOA POLITRAUMATIZADA |               |
| Ingred Conceição Araújo                                                                                    |               |
| Paulo Brenno Sampaio Lima                                                                                  |               |
| Brena de Jesus Rios Xavier                                                                                 |               |
| Izabela Bastos Silva dos Santos                                                                            |               |
| Nicolle Paiva Gomes                                                                                        |               |
| Karen de Moura Rolim Santos                                                                                |               |
| Yasmin Pinheiro Figuêredo                                                                                  |               |
| Manuela Costa Freitas                                                                                      |               |
| Caroline Barbosa da Silva Porto                                                                            |               |
| Andressa de Souza Batista                                                                                  |               |
| <b>DOI 10.37423/241109453</b>                                                                              |               |
| <br><b>CAPÍTULO 3 .....</b>                                                                                | <br><b>35</b> |
| O CÂNCER DE MAMA E SUA RELAÇÃO COM CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.       |               |
| FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS                                                                                  |               |
| ROBERTA MELQUIADES SILVA DE ANDRADE                                                                        |               |
| CELIA CRISTINA DIOGO FERREIRA                                                                              |               |
| <b>DOI 10.37423/241109454</b>                                                                              |               |

|                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>CAPÍTULO 4 .....</b>                                                                                                                 | <b>49</b>  |
| APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM A PESSOA POLITRAUMATIZADA À LUZ DE LEVINE                                                           |            |
| Karen de Moura Rolim Santos                                                                                                             |            |
| Yasmin Pinheiro Figuêredo                                                                                                               |            |
| Manuela Costa Freitas                                                                                                                   |            |
| Caroline Barbosa da Silva Porto                                                                                                         |            |
| Andressa de Souza Batista                                                                                                               |            |
| Ingred Conceição Araújo                                                                                                                 |            |
| Paulo Brenno Sampaio Lima                                                                                                               |            |
| Brena de Jesus Rios Xavier                                                                                                              |            |
| Izabela Bastos Silva dos Santos                                                                                                         |            |
| Nicolle Paiva Gomes                                                                                                                     |            |
| <b>DOI 10.37423/241109458</b>                                                                                                           |            |
| <b>CAPÍTULO 5 .....</b>                                                                                                                 | <b>68</b>  |
| RISCOS ASSOCIADOS AO USO DE OXANDROLONA POR MULHERES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA                                                           |            |
| MACIELLE SILVA BARROSO                                                                                                                  |            |
| CRISTIANE VIZIOLI DE CASTRO GHIZONI                                                                                                     |            |
| <b>DOI 10.37423/241109460</b>                                                                                                           |            |
| <b>CAPÍTULO 6 .....</b>                                                                                                                 | <b>100</b> |
| PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E EVOLUÇÃO CLÍNICA DO PÓS-OPERATÓRIO DE APENDICITES AGUDAS EM UM HOSPITAL DO SUL DO BRASIL                        |            |
| Andressa Maria Carus                                                                                                                    |            |
| Maria Eduarda Coelho da Maia                                                                                                            |            |
| Kelser de Souza Kock                                                                                                                    |            |
| <b>DOI 10.37423/241109461</b>                                                                                                           |            |
| <b>CAPÍTULO 7 .....</b>                                                                                                                 | <b>121</b> |
| A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA ALIADA AOS EXERCÍCIOS LÚDICOS NO BEM-ESTAR DE IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA |            |
| Thais Caroline Casagrande                                                                                                               |            |
| Bianca Tâmela Kapazi                                                                                                                    |            |
| <b>DOI 10.37423/241109462</b>                                                                                                           |            |
| <b>CAPÍTULO 8 .....</b>                                                                                                                 | <b>125</b> |
| EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM UM INDIVÍDUO PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO: UM ESTUDO DE CASO                              |            |
| Fernanda Jesus da Silva                                                                                                                 |            |
| Jessica Fernanda Zoz Bolomini                                                                                                           |            |
| Gideane Borges Gai                                                                                                                      |            |
| <b>DOI 10.37423/241109464</b>                                                                                                           |            |

**USO DE TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO COGNITIVO EM UTIS: REDUZINDO O IMPACTO DO DELÍRIO**

**SONIA MARIA SIMÃO DE MIRANDA GONÇALVES**

Ana Paula da Silva Andrade

Vitória Caroline Rendeiro Silva

**DIEGO PATRICK FERREIRA RIBEIRO**

Deydianne da Silva Soares

Maria Beatriz Conceição Nunes

Elielson de Souza Barros

**ELICA BRITO BALIEIRO**

Fláisa Garcia de Araújo

Patryck Sabyno Costa Silva

**DOI 10.37423/241109481**

# Capítulo 1



10.37423/241109440

## RISCO NUTRICIONAL EM PACIENTES CARDIOPATAS INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

LUANA CARVALHO DOS SANTOS

*Escola de Saúde Pública do  
Maranhão/SESMA*

CAROLINE TAVARES DA SILVA TORRES

*Escola de Saúde Pública do  
Maranhão/SESMA*

ERIKA MEIRE DOS SANTOS MARTINS

*Escola de Saúde Pública do  
Maranhão/SESMA*

ROBSON EDUARDO DA SILVA ARAUJO

*Escola de Saúde Pública do  
Maranhão/SESMA*

SIMONE MAYANE MENDES DOS SANTOS

*Hospital Universitário da Universidade  
Federal do Maranhão/EBSERH*

RENATA DE SOUSA GOMES PORTELA

*Escola de Saúde Pública do  
Maranhão/SESMA*



## INTRODUÇÃO

As cardiopatias são doenças que afetam o funcionamento do sistema cardiovascular e circulatório e são consideradas a principal causa de morte no Brasil e no mundo (PRÉCOMA et al., 2019; Cuppari, 2019). Os fatores de risco associados às doenças cardiovasculares podem ser divididos em não modificáveis, como etnia, sexo, idade e histórico familiar, e modificáveis, como tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, dislipidemias (Pinheiro, 2022).

Há uma prevalência crescente de internações hospitalares, principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), devido a descompensações cardiovasculares (Bahia et al., 2022). Essas complicações cardiovasculares contribuem para a alta mortalidade entre os pacientes internados em UTIs (Bahia et al., 2022).

O risco aumentado de morbidade e mortalidade em pacientes hospitalizados pode ser identificado pelo risco nutricional, por meio de questionários de triagem nutricional (Leonhardt; Paludo, 2013). A triagem nutricional é um instrumento utilizado para identificar o risco nutricional em pacientes hospitalizados. Através dela, é possível detectar o risco nutricional, sinalizar a desnutrição e identificar resultados negativos para a saúde do paciente, possibilitando cuidados nutricionais adequados e um melhor acompanhamento (Pinheiro et al., 2023; Dayane et al., 2016).

A Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (BRASPEN) recomenda a utilização do Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002) para detecção de risco nutricional durante as primeiras 48 horas da admissão do paciente (Kondrup et al., 2003; Castro et al., 2023). Acredita-se que muitos dos pacientes cardiopatas internados apresentam desnutrição ou risco nutricional, devido à sua condição de base e ao fato de muitos permanecerem hospitalizados por longos períodos (Pinheiro et al., 2023; Dayane et al., 2016).

A NRS 2002 é considerada um método padrão-ouro para a identificação do risco nutricional em pacientes adultos hospitalizados. Esse instrumento é dividido em duas partes: a primeira parte aborda questões sobre a perda de peso não intencional nos últimos três meses, o Índice de Massa Corporal (IMC) e a redução da ingestão alimentar na última semana, enquanto a segunda parte avalia fatores relacionados à gravidade da doença. Além disso, a idade acima de 70 anos é considerada um fator de risco adicional na classificação do risco nutricional pela NRS. Os pacientes são classificados com risco nutricional quando o escore total for  $\geq 3$  pontos (Pinheiro et al., 2023; Dayane et al., 2016).

Estudos apontam a NRS 2002 como bom indicador do prognóstico de pacientes hospitalizados, especialmente em relação à mortalidade e ao tempo de internação hospitalar entre pacientes com diferentes tipos de patologia (Chen et al., 2022; Pinheiro et al., 2023).

Dessa forma, é essencial identificar precocemente o risco nutricional, possibilitando a implementação precoce de uma terapia nutricional adequada, a fim de evitar ou minimizar a desnutrição. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo identificar o risco nutricional em pacientes cardiopatas internados em Unidades de Terapia Intensiva de um hospital de alta complexidade do estado do Maranhão.

## METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo, realizado com 205 pacientes internados nas UTI's Gerais, Cardiológica e Cirúrgica do Hospital Dr. Carlos Macieira, localizado em São Luís – MA, no período de janeiro a agosto de 2022. Os dados foram coletados através do prontuário eletrônico e do banco de dados do Serviço de Nutrição, sendo dados antropométricos coletados como parte do protocolo de avaliação realizado por nutricionistas na rotina hospitalar. Foram utilizados para esta pesquisa os dados registrados na admissão do paciente.

Foram incluídos pacientes maiores de 18 anos com permanência mínima de 24 horas na UTI. Foram excluídos pacientes menores de idade, gestantes, com tempo de internação menor que 24 horas, pacientes em cuidados paliativos e pacientes com diagnóstico de morte encefálica.

As variáveis sociodemográficas coletadas do prontuário foram: sexo, idade, motivo de internação na UTI e ventilação mecânica (sim ou não). Em relação às variáveis antropométricas, foram coletados altura e peso disponíveis no prontuário eletrônico registrados na admissão do paciente. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado utilizando as variáveis de peso aferido/estimado e altura aferida/estimada, com o resultado calculado em  $\text{kg/m}^2$ . Para adultos, foram adotados os pontos de corte da Organização Mundial da Saúde (OMS) (OMS, 2000), sendo classificados da seguinte forma:  $\text{IMC} < 18,5 \text{ kg/m}^2$  (desnutrição);  $\text{IMC} \geq 18,5$  até  $24,9 \text{ kg/m}^2$  (eutrofia);  $\text{IMC} \geq 25$  até  $29,9 \text{ kg/m}^2$  (sobrepeso); e  $\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$  (obesidade). O indivíduo foi considerado com excesso de peso quando apresentava sobrepeso ou obesidade. Para os idosos, foi utilizada a classificação de Lipchitz (1994), sendo classificados da seguinte forma:  $\text{IMC} < 22 \text{ kg/m}^2$  (desnutrição);  $\text{IMC}$  entre  $22\text{-}27 \text{ kg/m}^2$  (eutrofia) e  $\text{IMC} > 27 \text{ kg}$  (excesso de peso).

Foram colhidos nos prontuários dados referentes à triagem nutricional realizada no momento da admissão, conforme protocolo institucional. Essa triagem é feita por meio de uma ferramenta validada para rastreamento do risco nutricional nos pacientes, o Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002), que é subdividida em duas partes: sendo a primeira com questões referente a perda de peso não intencional nos últimos 3 meses, o Índice de Massa Corporal (IMC) e a ingestão alimentar reduzida na última semana. E a segunda abrange itens relacionados à gravidade da doença e ainda considera pacientes idosos com idade  $\geq 70$  anos como fator de risco adicional. Os pacientes são classificados em risco nutricional caso o escore total for  $\geq 3$  pontos (Kondrup et al., 2003). Foram considerados como alto risco nutricional pacientes com pontuação  $\geq 5$  (Mcclave et al., 2016).

Os dados foram analisados pelo programa Stata14. As variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequência e porcentagem.

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, sob parecer Nº 5.482.844.

## RESULTADOS

**Tabela 1-** Características sociodemográficas, clínicas, antropométricas, risco nutricional e IMC de pacientes cardíacos internados em UTI, São Luís –MA.

| Característica             | Total<br>(n=203) |
|----------------------------|------------------|
| <b>Gênero</b>              |                  |
| Masculino                  | 123 (60,6%)      |
| Feminino                   | 80 (39,4%)       |
| <b>Idade</b>               |                  |
| Adultos                    | 64 (31,5%)       |
| Idosos                     | 139 (68,5%)      |
| <b>Diagnósticos</b>        |                  |
| Cardiopata Clínico         | 92 (45,3%)       |
| Cardiopata pós-cirúrgico   | 111 (54,7%)      |
| <b>Ventilação mecânica</b> |                  |
| Não                        | 148 (72,9%)      |
| Sim                        | 55 (27,1%)       |
| <b>IMC</b>                 |                  |
| Desnutrido                 | 28 (13,8%)       |
| Eutrofia                   | 66 (32,5%)       |
| Excesso de peso            | 109 (53,7%)      |
| <b>NRS</b>                 |                  |
| Sem risco                  | 60 (29,6%)       |
| Com risco                  | 117 (57,6%)      |
| Alto risco                 | 26 (12,8%)       |

IMC. Índice de Massa Corporal; NRS: Escore de Risco Nutricional

Na Tabela 1, dos 203 pacientes estudados, observou-se que a maioria era do sexo masculino (60,6%), e 68,5% dos pacientes eram idosos. Houve uma distribuição quase equitativa entre cardiopatas clínicos (45,3%) e cardiopatas pós-cirúrgicos (54,7%). A maioria dos pacientes não necessitava de ventilação mecânica (72,9%).

Em relação ao estado nutricional, a distribuição do Índice de Massa Corporal (IMC) revelou que a maior parte dos pacientes estava com excesso de peso (53,7%), enquanto apenas 13,8% apresentavam desnutrição pelo IMC. Entretanto, quanto ao risco nutricional avaliado pela NRS, 57,6% dos pacientes apresentavam algum nível de risco nutricional, sendo que 12,8% estavam em alto risco.

## DISCUSSÃO

Quanto à avaliação antropométrica, observou-se que grande parte da amostra estava com excesso de peso. De forma semelhante, 52% dos pacientes do estudo de Souza e colaboradores (2018) também apresentavam excesso de peso. A alta prevalência de sobrepeso e obesidade está diretamente relacionada às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), entre elas as doenças cardiovasculares (Souza et al., 2018). Por outro lado, Garces e colaboradores (2021), ao avaliarem antropometricamente pacientes com insuficiência cardíaca internados em um hospital de referência no estado do Pará, observaram que a maioria da amostra estava em eutrofia em relação ao IMC.

Quanto ao risco nutricional avaliado pela NRS, a maioria dos pacientes estava em risco nutricional. O estudo de Pinheiro e colaboradores (2023) avaliou o risco nutricional em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM) em um hospital de Belém do Pará, encontrando resultados semelhantes aos deste estudo. Observou-se que o IAM afetou principalmente indivíduos idosos, do sexo masculino e com sobrepeso. Por outro lado, a maioria dos pacientes foi classificada como sem risco, de acordo com a NRS 2002. Essa situação pode ser explicada pelo fato de que o IAM na maioria das vezes ocorre de maneira silenciosa, sem comprometimento prévio do estado geral de saúde. No entanto, pacientes que sofrem eventos agudos como o IAM podem desenvolver risco nutricional durante a internação, devido a fatores como a baixa aceitação da dieta hospitalar, comprometimento clínico e outras condições que podem não ser identificadas nas primeiras 48 horas de admissão hospitalar (Pinheiro et al., 2023).

Em um estudo que associou o risco nutricional, avaliado segundo as ferramentas de triagem nutricional, e os desfechos clínicos em pacientes internados em UTIs, observou que pacientes com risco nutricional segundo a ferramenta NRS-2002 tiveram associações com maior tempo de

permanência na UTI, uso de ventilação mecânica, infecção e óbito, em comparação aos pacientes classificados sem risco nutricional (Marchetti et al., 2019). Em se tratando do prognóstico de pacientes com insuficiência cardíaca triados com risco nutricional pela NRS-2002, observou-se não apenas uma internação hospitalar inicial mais prolongada, mas também uma maior incidência de re-hospitalização em um ano (Chen et al., 2022). Krey e colaboradores (2021), ao avaliarem o perfil nutricional de pacientes cardiopatas em cuidados paliativos, identificaram que 82,17% da amostra apresentava risco nutricional ao serem admitidos nesse contexto.

## CONCLUSÃO

Dos pacientes estudados, a maioria eram idosos, do sexo masculino e com excesso de peso. Quanto ao risco nutricional, a maioria estava em risco nutricional segundo a NRS 2002. Esses achados permitem um monitoramento contínuo dos pacientes, visando a recuperação do estado nutricional e a prevenção de pre-hospitalizações. A aplicação da NRS 2002 é fundamental na UTI, pois permite a identificação precoce de pacientes em risco nutricional e a intervenção assertiva, dado que é bem estabelecido que o risco nutricional é prevalente entre pacientes cardíacos e se torna um dos determinantes mais importantes no tempo de internação hospitalar e na mortalidade hospitalar, especialmente em idosos.

## REFERÊNCIAS

- BAHIA, F. C. et al. Estado nutricional de idosos cardiopatas admitidos em uma unidade de terapia intensiva em Santo Antônio de Jesus, Bahia. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 8, p. e23311830953, 17 jun. 2022.
- CASTRO, M. G. et al. Diretriz BRASPEN de Terapia Nutricional no Paciente Grave. *BRASPEN journal*, p. 2–46, 2023.
- CHEN, Z. et al. The association of nutritional risk screening 2002 with 1-year re-hospitalization and the length of initial hospital stay in patients with heart failure. *Frontiers in nutrition*, v. 9, 2022.
- CUPPARI L, AVESANI CM, BUFARAH MNB, MELO TL. *Nutrição clínica no adulto*. Editora Manole Ltda, 2019.
- DAYANE, L. et al. Avaliação e Triagem Nutricional em Pacientes Críticos Evaluation and Nutrition Screening in Critical Patients. *Com. Ciências Saúde*, v. 27, n. 4, p. 327–338, 2016.
- FERNANDES, E. M. OLIVEIRA, L. MORAES, I. M. Avaliação do risco nutricional em pacientes internados na cardiologia. *Revista Científica* *Revista Científica*. p. 6-11, 2012.
- GARCES, Dayanne Caroline Pinheiro. *Avaliação nutricional de pacientes com insuficiência cardíaca internados em um hospital referência no estado do Pará*. Orientadora: Rejane Maria Sales Cavalcante Mori; 2021. 60 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Faculdade de Nutrição, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2021.
- KONDRUP J, et al. Ad Hoc ESPEN Working Group. Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. *Clin Nutr* 2003; 22(3):321-336
- KREY, I. et al. Perfil nutricional de pacientes cardiopatas em abordagem paliativa. *Deleted Journal*, v. 36, n. 3, p. 276–281, 1 jan. 2021.
- LEONHARDT, V. K.; PALUDO, J. Identificação do risco nutricional em pacientes hospitalizados através da triagem nutricional. *Revista Destaques Acadêmicos*, v. 5, n. 3, 16 set. 2013.
- LIPSCHITZ, D. A. Screening for nutritional status in the elderly. *Primary Care*, 1: 55-67, 1994.
- MARCHETTI, J. et al. High nutritional risk is associated with unfavorable outcomes in patients admitted to an intensive care unit. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 31, n. 3, 2019.
- MCCLAVE, S. A. et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient. *JPEN*, v. 40, n. 2, p. 159–211, 14 jan. 2016.
- WHO- World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. *Report of a WHO Consultation*. Geneva: World Health Organization; 2000.
- PINHEIRO, B. P. et al. Risco nutricional em pacientes com infarto agudo do miocárdio de um hospital público, Belém-PA *Revista Multidisciplinar em Saúde*, v. 4, n. 2, 2023.

PRÉCOMA, D. B. et al. Updated cardiovascular prevention guideline of the Brazilian society of cardiology – 2019. Rev Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 113, n. 4, p. 787– 891, 2019.

ROCHA, N. C. et al. Perfil nutricional de idosos cardiopatas internados em um hospital de referência em cardiologia / Nutritional diagnosis of elderly patients hospitalized in a reference hospital in cardiology. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 10, p. 95774–95786, 8 out. 2021.

SOUZA, Maria Camila Gonçalves Campos et al. Estado nutricional e aceitação da dieta por pacientes cardiopatas. Motri. Ribeira de Pena, v. 14, n. 1, p. 217-225, maio 2018.

## Capítulo 2



10.37423/241109453

# APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM À LUZ DA TEORIA DA ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY À PESSOA POLITRAUMATIZADA

*Ingred Conceição Araújo*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Paulo Brenno Sampaio Lima*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Brena de Jesus Rios Xavier*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Izabela Bastos Silva dos Santos*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Nicolle Paiva Gomes*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Karen de Moura Rolim Santos*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Yasmin Pinheiro Figueiredo*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Manuela Costa Freitas*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Caroline Barbosa da Silva Porto*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

*Andressa de Souza Batista*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-  
UEFS*

## Resumo

**Introdução:** A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é compreendida como todo conteúdo/ação que organize o trabalho profissional do enfermeiro, com base teórico-filosófica, que possibilite a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE), constituindo como uma atividade privativa do enfermeiro que contribui para a prevenção, promoção, recuperação e reabilitação do paciente. Frente a essa sistematização, temos a teoria de Callista Roy, a qual considera o indivíduo como um ser adaptativo e holístico, que estando em constante interação com o ambiente está sujeito a diversos estímulos e respostas. **Objetivo:** sistematizar a assistência de enfermagem baseado na teoria de Callista Roy no cuidado ao paciente politraumatizado. **Método:** Trata-se de um estudo descritivo, de uma experiência acadêmica vivenciada por discentes do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana na Bahia, durante o período de 12 de setembro a 24 de outubro de 2024, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), na Clínica Ortopédica. **Resultados:** A partir dos dados coletados em prontuário e em conversa com a paciente e seu familiar, foram construídos os diagnósticos e traçado o plano de cuidados, tendo como base científica a teoria de Callista-Roy, a qual evidenciou adaptação do paciente nos modos fisiológico, de autoconceito, função de papel e interdependência. **Considerações finais:** O cuidado foi composto ao avaliar os modos adaptativos e os estímulos para, assim, estabelecer diagnósticos e implementar cuidados de enfermagem necessários baseados em conhecimentos técnicos científicos pautados pela teoria de Callista Roy.

## INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é compreendida como todo conteúdo/ação que organize o trabalho profissional do enfermeiro, com base teórico-filosófica, e que possibilite a operacionalização do Processo de Enfermagem (PE). Dessa maneira, o processo de enfermagem se organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, o que incluir a avaliação de enfermagem, diagnóstico, planejamento de enfermagem, implementação e evolução, sendo que essa última etapa permite a análise e revisão de todo o processo de enfermagem (COFEN, 2024).

Dessa forma, a teoria que irá orientar o cuidado de enfermagem, fornece uma base teórico e científica que direciona e fundamenta as intervenções aplicadas a partir das bases científicas fornecidas, como exemplo, podemos citar a teoria de Callista Roy. Segundo essa teoria a prática de enfermagem é realizada através do processo de enfermagem (PE). O PE descrito no modelo teórico de Roy apresenta seis fases: avaliação de comportamento, avaliação de estímulos, diagnóstico de enfermagem, estabelecimento de metas, intervenção e avaliação. Nesse sentido, as etapas propostas por Callista apresentam uma correlação com as etapas do PE, visto que a avaliação de comportamentos e de estímulos corresponde a avaliação que já faz parte do processo de enfermagem, por exemplo. Assim, os pressupostos dessa teoria tratam a dignidade dos seres humanos e o papel da enfermagem na promoção da integridade, bem como busca compreender o que dificulta a adaptação dos indivíduos, considerando este como um sistema que frente a um estímulo irá apresentar comportamentos adaptativos, o que sinaliza para a importância de compreender as repercussões e conceito de TCE (Oliveira *et al*; 2019).

A principal causa de politrauma está ligada aos acidentes de trânsito com carros e motocicletas envolvendo condutores e pedestres. No Brasil, a cada ano, são registrados mais de um milhão de acidentes, matando cerca de 40 mil pessoas e deixando mais de 370 mil feridos, segundo o Ministério da Saúde. Nesse sentido, o politrauma pode ser entendido como um quadro em que o paciente sofre duas ou mais lesões graves em diferentes partes do corpo. Essas lesões podem afetar ossos, músculos e sistema nervoso, por exemplo. Podendo resultar em um prognóstico complexo. A utilização da teoria de Callista Roy, objetiva que as intervenções adotadas atendam as demandas físicas, sociais e emocionais desses indivíduos, visto que o trauma resulta em incapacidades ou longos períodos de recuperação (Martiniano *et al*; 2020).

As lesões de trânsito são um importante problema de saúde pública global, configurando entre as dez principais causas de morte em países de baixa e média renda e a sexta causa DALY (Disability Adjusted

Life Years – Anos de vida perdidos ajustados por incapacidade). Depois dos membros inferiores, os politraumatismos nas regiões do tórax e membros superiores são os que mais demandam assistência ortopédica entre as vítimas de acidentes de trânsito, sobretudo, no que se refere a intervenções cirúrgicas. Fraturas do úmero (osso do braço articulado ao ombro), por exemplo, correspondem a cerca de 3% de todas as fraturas no paciente politraumatizado. Diante disso, é perceptível que o politrauma representa uma importante e acentuada mudança para esse paciente do ponto de vista físico e emocional, o que exigirá um embasamento científico que fundamente as intervenções prestadas, o que justificava-se a utilização da teoria de Roy, que considera justamente tais mudanças e adaptações dos indivíduos para a construção do seu plano de cuidados (Ministério da Saúde, 2023).

Desse maneira, o atendimento ao paciente politraumatizado deve ser rápido, sistematizado e não deve pular etapas, de modo que não se negligencie a condição do paciente nem os riscos relacionados ao atendimento. Dessa forma, o primeiro passo para iniciar o atendimento é estruturar o tipo de conduta a ser feita, iniciando-se pelo que leva o paciente a óbito mais rápido. O diagnóstico de politrauma grave envolve uma avaliação clínica, exames laboratoriais e de imagem. O tratamento depende das lesões específicas, mas pode incluir: Estabilização, garantir a circulação, respiração e vias aéreas adequadas. Cirurgia Pode ser necessária para lesões graves, como fraturas ósseas ou lesões de órgãos. Medicamentos como analgésicos, antibióticos e medicamentos para controlar a pressão arterial. Fisioterapia e reabilitação, para pacientes com lesões graves, a reabilitação é importante para recuperar a funcionalidade. Acompanhamento psicológico, visto que pacientes com trauma físico grave podem enfrentar desafios emocionais significativos ( SANAR, 2021).

Diante disso, o presente estudo de caso busca analisar a seguinte situação problema, tendo como base o Processo de Enfermagem: Paciente C.A.S.R, 18 anos, mulher trans, trazida pela SAMU e admitido na sala vermelha do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) (09/09/2024) vítima de um acidente de carro com uma carreta em Berimbau, onde foi encontrado entre ferragens em Glasgow 3, apresentando Politrauma grave fratura de C3 ,fratura de fêmur bilateral, tibia esquerda e úmero direito.

Dessa maneira, a escolha do caso foi influenciada pela alta prevalência de acidentes de trânsito que tem o politrauma grave como consequência direta. Como já citado anteriormente, esse quadro clínico envolve manifestações sistêmicas, visto que temos um diagnóstico plural em que o cuidado e as intervenções exigiram a participação de uma equipe multidisciplinar. Desse modo, trabalhar com um paciente nessas circunstâncias permite uma melhor compreensão do cuidado integral, pois muitas

vezes o trauma exigirá um longo período de reabilitação, bem como da sistematização da assistência já que são casos complexos, com múltiplos curativos, várias medicações e procedimentos a serem realizados, o que exige do profissional e consequentemente dos discentes um olhar clínico que busque priorizar as condutas e cuidados de acordo com cada necessidade do paciente.

Sendo assim, este estudo constitui como uma parte importante e fundamental da formação acadêmica, uma vez que, permite o contato na prática com situações problemas que até então só haviam sido trabalhadas na teoria. o que representar uma oportunidade de desenvolver e aprimorar competências técnicas, mas sobretudo clínicas, usando uma teoria que possibilita organizar e identificar os principais diagnósticos de enfermagem em um paciente politraumatizado. o que além de gerar subsídios para uma formação acadêmica completa também permitiram a construção de um cuidado de enfermagem eficiente e resolutivo.

Portanto, o presente artigo tem como objetivo descrever a aplicação do processo de enfermagem pautado em Calista Roy à pessoa politraumatizada e descrever a SAE a pessoa com politrauma grave.

## OBJETIVO

Descrever a aplicação do processo de enfermagem pautado em Calista Roy à pessoa politraumatizada.

## METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo na modalidade de estudo de caso, de uma experiência acadêmica vivenciada por discentes do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana na Bahia, durante o período de 12 de setembro a 24 de outubro de 2024, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), na Clínica Ortopédica.

A paciente do estudo foi C.A.S.R, 18 anos, mulher trans, residente em Conceição do Jacuípe - BA, que foi vítima de uma colisão entre o carro em que estava e uma carreta, no qual o motorista foi a óbito e a paciente em questão ficou presa entre as ferragens. Foi admitida na Sala Vermelha do HGCA no dia 09 de setembro, trazida pela SAMU.

A coleta de dados e a assistência prestada ao paciente foram realizadas nos dias 18 e 24 de setembro, utilizando das ferramentas do Processo de Enfermagem (PE) como a Avaliação de Enfermagem, os Diagnósticos de Enfermagem, o Planejamento de Enfermagem, a Implementação e a Evolução de Enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem presentes nos estudos foram construídos a partir dos sinais e sintomas referidos ou apresentados pelos pacientes, e classificados de acordo com a

taxonomia do International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification (NANDA), as intervenções de enfermagem foram baseadas na Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e os resultados esperados foram respaldados na Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). Foram analisados o prontuário, os exames laboratoriais e os complementares (tomografia), além dos diagnósticos médicos.

Ademais, o presente estudo foi fundamentado na Teoria de Adaptação da pensadora Callista Roy, que é uma teoria de enfermagem que considera a pessoa como um sistema adaptativo e holístico, capaz de se adaptar e criar mudanças no ambiente. A teoria também considera que a pessoa recebe estímulos, internos ou externos, que podem desencadear respostas. Nesse modelo teórico de Roy, a pessoa é percebida como um sistema, que emite respostas adaptativas ou ineficientes; o ambiente é entendido como todas as condições, circunstâncias e influências que circundam e afetam o desenvolvimento e comportamento da pessoa. A saúde é revelada como um estado e um processo de ser. E, por último, as metas de enfermagem são vistas como a promoção de respostas adaptativas da pessoa no universo dos quatro modos adaptativos (FRAZÃO *et al*; 2013). A teoria apresenta quatros modos adaptativos são denominados de: modo fisiológico, que diz respeito à oxigenação, nutrição, eliminação, atividade e repouso e proteção; Autoconceito, que versa sobre os aspectos psicológicos e espirituais do ser humano; Desempenho de papeis e interdependência que refere-se aos papeis que o ser humano desempenha na sociedade e sobre as necessidades afetivas, respectivamente. Esses modos foram desenvolvidos para servir como uma estrutura para avaliação do comportamento gerado através dos estímulos. Sendo esses estímulos definidos como: focais são os que confrontam imediatamente a pessoa. Os contextuais são todos os outros estímulos presentes na situação e que contribuem para o efeito do estímulo focal. E os residuais são características constituintes da pessoa, que interferem na situação (FRAZÃO *et al*; 2013).

Diante disso, correlacionamos as fases do PE ao modelo teórico de Callista Roy. Na fase 1, correspondente à avaliação de comportamento, na qual analisamos os quatro modos de adaptação defendidos por Callista, utilizando a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico) do PE. Após a coleta de dados, buscamos identificar quais os estímulos que influenciam a adaptação do paciente nos quatro modos. No PE, o diagnóstico de enfermagem é a identificação dos problemas e necessidades de saúde, utilizando o NANDA, enquanto na Teoria de Roy ele se relaciona à avaliação das respostas de adaptação. Na etapa de planejamento, procuramos estabelecer objetivos focados em melhorar a capacidade de adaptação do paciente, auxiliando-o a responder de maneira mais

adaptativa aos estímulos. Essa fase corresponde ao planejamento de Enfermagem, que visa determinar intervenções e resultados desenvolvidos em um plano assistencial que será implementado. E por fim, a avaliação consiste em verificar se o paciente evoluiu em suas respostas adaptativas e se as metas planejadas foram alcançadas, sendo necessário ajustar o plano se necessário. A Teoria de Callista Roy oferece uma estrutura para entender as respostas adaptativas do paciente, o que, por sua vez, enriquece cada etapa do Processo de Enfermagem. Ela orienta enfermeiros a realizar avaliações mais abrangentes, a planejar intervenções mais eficazes e a promover uma recuperação focada na adaptação holística do indivíduo.

A construção do presente estudo foi autorizada pela genitora da paciente após esclarecimentos acerca do objetivo e da relevância do estudo, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), pois a mesma não tinha condições de assinar devido às queimaduras e à desorientação que apresentava durante alguns momentos. O estudo de caso está em conformidade com a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde respeitando os princípios éticos da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob o protocolo nº 3706976/2019.

## RESULTADOS



### História clínica

Paciente C.A.S.R, 18 anos, mulher trans, trazida pela SAMU e admitido na sala vermelha 09/09/2024 vítima de um acidente de carro com uma carreta em Berimbau, onde foi encontrado entre ferragens em Glasgow 3, foi entubada e estava em uso de colar cervical. Em seguida foi para o CC, onde foi feita a fixação externa bilateral em fêmur e desbridamento de queimaduras. No mesmo dia foi admitido na UTI 5. No dia 17/09/2024 foi admitida na clínica ortopédica às 20;10 vindo da UTI 5, na companhia da

técnica de enfermagem, maqueiro e da mãe, com diagnóstico médico de osteossíntese de fêmur bilateral SEC P4 + desbridamento de queimaduras, relata que quer ser chamada pelo nome social.

#### **Evolução de enfermagem (18/09/2024)**

Paciente C.A.S.R., mulher trans, no 9º DIH devido ao politrauma grave, TCE grave, fratura de C3, fêmur bilateral, tíbia esquerda e úmero direito. Encontrada em decúbito dorsal, **restrita ao leito** com **impossibilidade de se movimentar** devido às fraturas e fixadores. Apresenta-se sonolenta e quando acordada está emotiva, **chorando e rindo de forma incontrolável e com falas repetitivas**. Foi demonstrado **discordâncias entre ela e a família relacionadas a sua identidade de gênero**, existindo o não uso dos pronomes solicitados e o não chamamento pelo nome social, o que deixava a paciente ainda mais reativa. Evolui corada, eupneica, normocárdica e com as extremidades aquecidas, **aceitando dieta hospitalar líquida com auxílio** por meio de canudo devido a **disfagia**. Em uso de colar cervical, acesso venoso central em jugular direita em que são administradas **medicações irritantes e vesicantes**, SVF, tala gessada em MSD e **fixador externo bilateral** nos MMII. Em relação ao neurológico: memória anteróloga preservada (orientada acerca do próprio nome, da idade e de quem a acompanha (sua irmã)), **memória retrógrada prejudicada** (não se lembra dos acontecimentos do acidente até o dia atual). Ao exame físico: pele corada, hidratada, feridas por queimaduras em face sem exsudato, mucosas normocrômicas, acuidade visual diminuída no olho direito, tórax simétrico, com expansibilidade mantida e murmúrio vesicular por todo o pulmão, bulhas normofonéticas em 2T, abdome distendido, ruídos hidroaéreos presente, som maciço no QIE, tenso e indolor à palpação. Em relação às eliminações presença de diurese com volume de 100ml de coloração amarelo forte na bolsa coletora e dejeções ausentes. Em relação às **queimaduras** pélvicas, no MIE e na coxa direita, estão em processo de epitelização e apenas da região superior do MIE apresentava baixo exsudato, a paciente relatou e fez expressões faciais de **dor** durante o procedimento de limpeza das feridas e também no **banho no leito**. SSVV: T: 36°C, FC: 70 bpm, P: 71 bpm, FR: 22inc, PA: 110 x 80 mmHg, HGT: 90 mg/dL, SPO2: 98%.

#### **Evolução de enfermagem (24/09/24)**

Paciente C.A.S.R., mulher trans, no 15º DIH expressando **medo** e **ansiedade** em relação ao **internamento prolongado**, visto que já passou um **longo período sem trabalhar** e sente que passará ainda mais devido às lesões. A acompanhante afirma agitação da paciente na noite anterior, insônia e que a **sociabilidade da paciente tem diminuído desde o início da internação**. Evolui **restrita ao leito**, corada, eupneica, normocárdica e normotensa. Apresenta melhora na disfagia ao aceitar dieta

hospitalar sólida em tamanhos pequenos. Mantém-se em uso de colar cervical, acesso venoso em jugular direita, SVF, tala gessada em MSD e fixador externo bilateral nos MMII. Continua com memória retrógrada prejudicada, glasgow 13 e diminuição da acuidade visual no olho direito. Ao exame físico: pele corada, hidratada, apresentando secreção serosanguinolenta e necrose em feridas por **queimaduras**, secundário a acidente automobilístico em face, MSE, pelve e MIE., tórax plano, simétrico, BCNF em 2T, em ventilação espontânea, abdômen plano, sem distensão, ruídos hidroaéreos ausentes. Em relação às eliminações diurese presente em coloração amarelada forte em bolsa coletora, dejeções ausentes. É importante evidenciar que a paciente continua relatando e fazendo expressões faciais de **dor** durante o procedimento de limpeza das feridas. SSVV: T: 36,3°C, FC: 82 bpm, P: 79 bpm, FR: 19 inc, PA: 130 x 90 mmHg, HGT: 96 mg/dL, SPO2: 95%.

### Cuidados de enfermagem

18/09/2024

08:30 Aferir sinais vitais.

09:00 Banho no leito, a paciente verbalizou e demonstrou facilmente dor durante o procedimento.

10:00 Exame físico.

11:00 Escuta das necessidades e dos desabafos da paciente, nesse momento foi demonstrado discordâncias entre ela e a família relacionadas a sua identidade de gênero, existindo o não uso dos pronomes solicitados e o não chamamento pelo nome social.

14:30 realizado curativo em MIE com SF 0,9% na região com exsudato, cobertura da hidrofibra de prata mantida e trocada a gaze agodoada e atadura, fixada com micropore. Feita limpeza das queimaduras com SF 0,9%, retirando a pele que estava descamando com gaze estéril e aplicado creme barreira por toda a região. Paciente relatou dor durante o procedimento.

24/09/2024

10:00 Realizado curativo em ferida por queimaduras, secundário a acidente automobilístico em face, MSE, pelve e MIE. Feridas úmidas, apresentando conteúdo serosanguinolento, presença de tecido necrótico. Realizado desbridamento mecânico utilizando lâmina de bisturi e luva estéril, limpeza com uso de SF 0,9%, clorexidina degermante e gaze estéril, utilizado cobertura contendo alginato de cálcio no leito e creme de barreira nas bordas das feridas localizadas em MSE, pelve e MIE, e sulfadiazina de

prata em ferida de face. Coberto com gaze estéril, ataduras e micropore. Paciente relatou dor durante o procedimento, sem mais intercorrências.

No dia 17/10/2024 a paciente recebeu alta e orientações acerca dos cuidados com as feridas.

### **Medicações prescritas**

- Atropina 0,25 mg/dL 6h em 6h sublingual

Administrar: 2 gotas

A atropina é eficaz no manejo da hipersalivação em pacientes que enfrentam dificuldades para engolir. Dessa forma, é possível notar que a paciente apresentava disfagia e o controle da hipersalivação é essencial para diminuir os riscos de aspiração;

- Bromoprida 5 mg/ml 6h em 6h injetável

Administrar: 20mg

A bromoprida é um remédio antiemético e procinético. Apesar da paciente não apresentar sintomas relacionados ao uso da medicação durante os dias da prestação do cuidado, vale ressaltar a importância de evitar náuseas e vômitos não só pelo desconforto, como também para o risco de aspiração. Além disso, a medicação tramadol também prescrita tem como efeito adverso náuseas e vômitos;

- Dipirona 500 mg/ml 4h em 4h IV

Administrar: 2000mg

A dipirona é um fármaco que tem potente ação antipirética, analgésica e antiespasmódica. Portanto, essa medicação se mostra essencial para o tratamento do paciente que apresenta dor devido aos procedimentos, as queimaduras, e ao próprio trauma;

- Enoxaparina 40 mg/ 0,4ml 1x ao dia subcutânea

Administrar: 1SER

A enoxaparina é um anticoagulante injetável indicado para prevenir a formação de coágulos ou trombos nos vasos sanguíneos, em pessoas que foram submetidas a cirurgias e que apresentam mobilidade reduzida como a paciente do caso;

- Lactulose xarope 120 ml 12h em 12h

Administrar; 30 ml

Lactulose é indicada para o tratamento sintomático da [constipação intestinal](#). Embora a paciente não esteja, é possível que devido a restrição ao leito e traumas neurológicos apresente dificuldade em realizar dejeções;

- Tramadol 100mg 8h em 8h IV

Administrar: 100mg

O tramadol é um medicamento analgésico, do tipo opióide, que atua sobre o sistema nervoso central e está indicado para aliviar dor moderada a intensa, muitas vezes indicada pela paciente devido manipulações, procedimentos, traumas;

#### **Exames laboratoriais:**


Dos exames laboratoriais do dia de admissão foi perceptível alterações: Hb:12,2 g/dL (13,5-18,0 g/dL), Ht: 38% (40-56%), Leucograma; 12.200/mm<sup>3</sup> (4.000 - 10.000/mm<sup>3</sup>), TGP: 95 (50 U/L). Indicativos que reforçam o quadro clínico do paciente que devido ao acidente teve perdas sanguíneas e também desencadeou a resposta do sistema imunológico, principalmente devido a integridade da pele prejudicada, o TGP alterado pode indicar uma possível lesão nas células do fígado devido ao trauma ou algum antecedente do paciente.

#### **Exames complementares:**

TC de coluna cervical (09/09): fratura cominutiva da lâmina / pedículo direito de C3, com extensão para o processo articular correspondente.

TC de abdomen (09/09); fígado apresenta-se com morfologia, contornos, dimensões e coeficientes de atenuação do parênquima normais. Não há dilatação das vias biliares intra ou extra hepáticas. Rins de topografia, forma, contornos, dimensões e coeficientes de atenuação preservados. Não há alterações grosseiras nos sistemas pielocaliciais e nos ureteres. Baço, pâncreas e adrenais com forma, contornos, dimensões e coeficiente de atenuação normais. Gorduras periviscerais preservadas. Aorta abdominal e veia cava inferior de contornos e calibre normais. Não evidenciamos adenomegalias retroperitoneais ou coleções líquidas livres na cavidade peritoneal. Bexigas com contornos e morfologia conservados e ausência de lesões expansivas na cavidade abdominal;

# Anexo 1: Fluxograma dos Modos de Adaptação do paciente à luz de Callista Roy



**Fonte:** Autoria própria.

**Quadro 01:** Elaboração de Diagnósticos de Enfermagem baseado na taxonomia da NANDA-I pela Teoria da Adaptação de Callista Roy.

| <b>MODO DE ADAPTAÇÃO: FISIOLÓGICO</b>                 |                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROBLEMAS DE ENFERMAGEM</b>                        | <b>DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM</b>                                                                                                                                               | <b>RESULTADOS ESPERADOS</b>         | <b>INTERVENÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>APRAZAMENTO</b>                                                                  |
| Dor durante o banho no leito e a limpeza das feridas. | Dor aguda relacionada a agentes físicos lesivos e traumáticos evidenciado por relatos verbais de dor, expressões faciais de desconforto durante a realização de procedimentos. | Reduzir a intensidade da dor.       | Avaliar e registrar a intensidade da dor;<br>Administrar analgesia conforme prescrição;<br>Realizar manipulações de forma cuidadosa.                                                                                                                | Sempre que necessário;<br><br>Conforme prescrição;<br><br>Durante os procedimentos. |
| Queimaduras e fixador externo bilateral.              | Integridade da pele prejudicada relacionada a fatores mecânicos e cirúrgicos evidenciado por queimadura pélvica, no MIE e na coxa direita, fixador externo bilateral.          | Restabelecer a integridade da pele. | Realizar limpeza das queimaduras com SF 0,9% e gaze estéril, com remoção dos tecidos desvitalizados;<br>Realizar limpeza da área peri fixador, com remoção mecânica de tecidos desvitalizados;<br>Orientar o paciente sobre os cuidados com a pele. | Após o banho.                                                                       |

| MODO DE ADAPTAÇÃO: FISIOLÓGICO                        |                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PROBLEMAS DE ENFERMAGEM                               | DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM                                                                                                                                                      | RESULTADOS ESPERADOS                | INTERVENÇÕES                                                                                                                                                                                                                                        | APRAZAMENTO                                                                 |
| Dor durante o banho no leito e a limpeza das feridas. | Dor aguda relacionada a agentes físicos lesivos e traumáticos evidenciado por relatos verbais de dor, expressões faciais de desconforto durante a realização de procedimentos. | Reduzir a intensidade da dor.       | Avaliar e registrar a intensidade da dor;<br>Administrar analgesia conforme prescrição;<br>Realizar manipulações de forma cuidadosa.                                                                                                                | Sempre que necessário;<br>Conforme prescrição;<br>Durante os procedimentos. |
| Queimaduras e fixador externo bilateral.              | Integridade da pele prejudicada relacionada a fatores mecânicos e cirúrgicos evidenciado por queimadura pélvica, no MIE e na coxa direita, fixador externo bilateral.          | Restabelecer a integridade da pele. | Realizar limpeza das queimaduras com SF 0,9% e gaze estéril, com remoção dos tecidos desvitalizados;<br>Realizar limpeza da área peri fixador, com remoção mecânica de tecidos desvitalizados;<br>Orientar o paciente sobre os cuidados com a pele. | Após o banho.                                                               |

|                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Medicações irritantes e vesicantes. | Risco de trauma vascular relacionado a medicações irritantes e vesicantes.                                                          | Garantir bom funcionamento do acesso periférico; Ausência de sinais flogísticos; Ausência de trauma vascular. | Realizar flushing pulsátil; Observar as condições da estabilização, fixação e cobertura; Avaliar a presença de edema, rubor, temperatura (calor ou frio), dor, umidade no local e comparar o membro cateterizado com o membro contralateral. | Antes e após a administração de medicações. |
| Disfagia.                           | Deglutição prejudicada relacionado ao trauma evidenciado por disfagia.                                                              | Restabelecer boa deglutição para melhorar nutrição e prevenir risco de aspiração.                             | Posicionar o paciente com a cabeça elevada. Ofertar dieta líquida.                                                                                                                                                                           | Sempre que necessário.                      |
| Memória retrógrada prejudicada.     | Memória prejudicada relacionado ao TCE evidenciado por dificuldade de lembrar de eventos recentes / memória retrógrada prejudicada. | Melhorar a memória.                                                                                           | Realizar atividades / questionamentos que estimulem a memória.                                                                                                                                                                               | Durante os cuidados de rotina.              |

|                                              |                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                     |                                                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentando-se com auxílio e banho no leito. | Déficit de autocuidado relacionado ao TCE evidenciado por Incapacidade de realizar tarefas diárias de autocuidado de forma independente. | Melhorar a independência.                         | Oferecer assistência;<br><br>Auxiliar no banho;<br><br>Auxiliar na alimentação.                     | Sempre que necessário;<br><br>Durante o banho;<br><br>Durante as refeições. |
| Restrito ao leito.                           | Risco de lesão por pressão em adultos relacionado a restrição ao leito.                                                                  | Evitar o surgimento de LPP.                       | Esticar os lençóis e colocar colchão casca de ovo;<br>Manter a pele e o paciente hidratados.        | Durante os cuidados de rotina.                                              |
| Impossibilidade de se movimentar.            | Mobilidade física prejudicada relacionada às fraturas e os fixadores evidenciado por restrição ao leito.                                 | Promover a recuperação da mobilidade.             | Incentivar a realização de exercícios prescritos;<br>Solicitar apoio de fisioterapeuta.             | Sempre que possível.                                                        |
| <b>MODO ADAPTAÇÃO: AUTOCONCEITO</b>          |                                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                     |                                                                             |
| <b>PROBLEMAS DE ENFERMAGEM</b>               | <b>DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM</b>                                                                                                         | <b>OBJETIVOS</b>                                  | <b>INTERVENÇÕES</b>                                                                                 | <b>APRAZAMENTO</b>                                                          |
| Choro e riso incontrolável, emotividade.     | Controle emocional instável relacionado a lesões cerebrais evidenciado por choro e riso incontrolável, emotividade.                      | Estabilizar as emoções.                           | Escutar o paciente e estar atento às demandas biopsicossociais;<br>Buscar assistência do psicólogo. | Sempre que necessário.                                                      |
| Ansiedade.                                   | Ansiedade relacionada ao processo de hospitalização evidenciada por agitação, choro e insônia.                                           | Reduzir a ansiedade e promover um ambiente calmo. | Oferecer suporte emocional;<br>Buscar assistência do psicólogo.                                     | Sempre que necessário.                                                      |

| Medo.                                                                           | Temor relacionado ao processo de internamento evidenciado por medo.                                                                                                          | Reduzir a sensação de medo.                          | Oferecer suporte emocional;<br>Proporcionar informação clara e detalhada sobre o processo de internamento.                                                                                                                     | Sempre que necessário.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MODO DE ADAPTAÇÃO: FUNÇÃO DE PAPEL</b>                                       |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| PROBLEMAS DE ENFERMAGEM                                                         | DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM                                                                                                                                                    | OBJETIVOS                                            | INTERVENÇÕES                                                                                                                                                                                                                   | APRAZAMENTO                                       |
| Período extenso de internamento e longo período sem trabalhar.                  | Desempenho de papel ineficaz relacionada a estadia hospitalar evidenciado por interrupção do trabalho.                                                                       | Auxiliar no restabelecimento do desempenho de papel. | Solicitar apoio psicossocial;<br>Orientar a estabelecer um plano pós hospitalar.                                                                                                                                               | Sempre que necessário e antes da alta hospitalar. |
| Discordâncias entre a paciente e a família relacionados a identidade de gênero. | Processos familiares disfuncionais relacionados a invalidação e julgamento evidenciado por não aceitação da família a identidade de gênero da paciente (Mulher transgênero). | Promover o respeito à diversidade.                   | Abordar sobre as diferentes identidades de gênero com os familiares;<br>Enfatizar a importância de respeitar pronomes e identidade de gênero para evitar sentimentos de tristeza, apatia, ansiedade e distanciamento familiar. | Sempre que necessário.                            |
| <b>MODO DE ADAPTAÇÃO: INTERDEPENDÊNCIA</b>                                      |                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |
| PROBLEMAS DE ENFERMAGEM                                                         | DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM                                                                                                                                                    | OBJETIVOS                                            | INTERVENÇÕES                                                                                                                                                                                                                   | APRAZAMENTO                                       |

|                                                        |                                                                                                                |                              |                                                      |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Sociabilidade diminuindo desde o início da internação. | Interação social prejudicada relacionada a internação hospitalar prolongada evidenciado por ruptura de rotina. | Melhorar a interação social. | Estimular a manutenção dos vínculos sociais prévios. | Sempre que necessário. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|

**Fonte:** Taxonomia da NANDA-I, 2021-2023.

## DISCUSSÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), orientada pela Teoria de Adaptação de Callista Roy, é um elemento central na prestação de um cuidado integral e eficiente a pacientes vítimas de politrauma. No caso da paciente C.A.S.R., de 18 anos, que sofreu múltiplas fraturas e queimaduras graves em um acidente automobilístico, a SAE permitiu que a equipe de enfermagem organizasse suas intervenções de maneira estruturada e individualizada, atendendo tanto às necessidades físicas quanto emocionais da paciente. A teoria de Roy enxerga a pessoa como um ser adaptativo em constante interação com seu ambiente, e orienta o cuidado com base nos quatro modos de adaptação: fisiológico, autoconceito, função de papel e interdependência, que foram fundamentais para o manejo das respostas da paciente ao trauma (Monteiro, 2016).

No modo fisiológico, a atenção esteve voltada para a estabilização das fraturas, a prevenção de complicações nas queimaduras e o manejo da dor. A aplicação criteriosa dos diagnósticos de enfermagem, como mobilidade física prejudicada e dor, permitiu a implementação de intervenções direcionadas, garantindo um processo de recuperação física mais seguro e eficiente.

No autoconceito, foi essencial reconhecer que C.A.S.R., além das repercussões físicas, enfrentava um impacto psicológico significativo em decorrência do trauma. A paciente apresentava episódios de emotividade exacerbada, como riso e choro incontroláveis, indicando uma dificuldade em lidar

emocionalmente com sua nova condição. A teoria de Roy destaca que a manutenção do autoconceito é fundamental para a adaptação, e por isso foi necessário um acompanhamento psicológico contínuo, facilitando que C.A.S.R. se reconectasse com uma imagem positiva de si mesma durante o processo de recuperação.

O modo de função de papel é particularmente relevante no caso de C.A.S.R., uma jovem em fase de transição para a vida adulta, cujo projeto de vida foi subitamente interrompido pelo acidente. Ajudar a paciente a aceitar suas limitações temporárias e reorganizar seus papéis sociais foi um dos desafios da equipe. Nesse processo, o envolvimento da família e de outros profissionais, como terapeutas ocupacionais, ajudou a promover a reabilitação e a reintegração social progressiva.

Por fim, no modo de interdependência, destacou-se a importância das relações interpessoais e do apoio social para a recuperação. A interação constante entre a equipe de saúde e a paciente ajudou a construir confiança, facilitando a adesão ao tratamento e a aceitação das intervenções terapêuticas. A equipe precisou também desenvolver uma escuta sensível para atender às manifestações emocionais da paciente, mostrando empatia e cuidado contínuo.

Outro aspecto relevante foi a consideração sobre identidade de gênero no processo de cuidado. C.A.S.R., se identificando como mulher trans, apresentou necessidades específicas que transcendem o manejo biológico das lesões. Embora a literatura sobre cuidados de enfermagem para pacientes trans ainda esteja em desenvolvimento, é essencial que a equipe adote uma abordagem inclusiva e respeitosa, considerando a possível necessidade de diagnósticos relacionados ao autoconceito e às interações sociais, que podem ser afetados por experiências de discriminação e estigma (Rosa, 2017). A validação da identidade da paciente foi incorporada ao plano de cuidados, com a equipe utilizando seu nome social e garantindo um ambiente de acolhimento, elementos essenciais para a adaptação emocional e social de C.A.S.R.

Nesse contexto, a SAE e a Teoria de Roy se complementam ao proporcionar um cuidado integral que englobasse tanto o corpo quanto a mente da paciente (Coelho, 2011). A aplicação dos quatro modos de adaptação assegurou que as necessidades biopsicossociais de C.A.S.R. fossem atendidas de maneira integrada e personalizada, facilitando a recuperação e promovendo a autonomia da paciente ao longo do tratamento. Assim, o processo de enfermagem guiado pela Teoria de Roy reafirma a importância de um cuidado centrado na pessoa, promovendo respostas adaptativas que respeitam a individualidade e complexidade de cada paciente.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência descreveu o cuidado de enfermagem a paciente politraumatizada que possibilitou acompanhar todas as suas singularidades de maneira sistematizada. O cuidado foi composto ao avaliar os modos adaptativos e os estímulos para, assim, concluir com diagnósticos e implementar cuidados de enfermagem necessários baseados em conhecimentos técnicos científicos pautados pela teoria de Callista Roy, sendo sempre avaliados para obter a melhora da paciente.

Este estudo contribui manifestando evidências para conduzir o cuidado específico e único implementado a paciente politraumatizada, sendo esses pacientes muito comuns em unidades de internação hospitalar, as condutas serão especializadas de acordo com cada modo adaptativo e estímulo apresentado pelos pacientes e aqui descritos baseados em dados científicos. Com linguagem clara e de fácil compreensão, a sociedade passa a conhecer a forma de trabalho que a equipe de enfermagem deve seguir, promovendo e compartilhando informações de qualidade.

Ademais, aspectos positivos foram associados aos cuidados de enfermagem e a melhora da paciente, já que a mesma obteve alta após assistência prestada pela equipe multiprofissional. A dor, disfagia e integridade da pele, no modo adaptativo fisiológico, foram melhorados com a implementação dos cuidados de enfermagem segundo a teoria de Callista Roy. Ao distanciamento da rotina, a paciente obteve alta, ou seja, não sendo necessários cuidados hospitalares que a distanciaram da sua rotina, melhorando questões psicológicas evidenciado pelo período extenso de internamento.

Contudo, pode ser considerado uma limitação do modelo de estudo de caso, a forma generalizada de abordar e sistematizar os problemas de enfermagem em indivíduos politraumatizados, considerando que cada individualidade muda as respostas a cada estímulo recebido. Dessa forma, estudos como esse devem ser realizados em escala maior e com métodos diferentes para abranger as singulares de demais pessoas com diferentes crenças, religiões, raça, cor ou etnia, entre outros.

## REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico, volume 54, nº 06. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-06>. Acesso em: 17 out. 2024.
- BULECHEK, G. M.; BUTCHER, H. K.; DOCHTERMAN, J. M.; WAGNER C. M. NIC Classificação das intervenções de enfermagem. Elsevier Brasil, 2015.
- COELHO, S. M. S.; MENDES, Isabel M. D. M. Da pesquisa à prática de enfermagem aplicando o modelo de adaptação de Roy. Esc. Anna Nery. v. 15, n. 4, p. 845-850, 2011. Disponível em: <<https://www.annanery.ufrj.br/>>. Acesso em: 22 out. 2024.
- COFEN. Resolução COFEN Nº 736 de 17 de janeiro de 2024. Dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem [Internet]. Brasília: COFEN; 2024 [cited 2024 Feb 01]. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>. Acesso em: 21 out. 2024.
- FRAZÃO, C. M. F. Q; FERNANDES, M.I.C; NUNES, M.G.M; SÁ, J.D; LOPES, M.V.O; LIRA, A.L.B.C. Componentes do modelo teórico de Roy em pacientes submetidos à hemodiálise. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 34, p. 45-52, 2013.
- HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S.; LOPES, C.T. Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2021-2023. Porto Alegre: Artmed. 2021.
- MARTINIANO, E. C.; NASCIMENTO, A.M.V; CAMPOS, J.R.C; CAMPOS, J.B.R; BARROS, A.B; LUZ, D.C.R.P. Cuidados de enfermagem ao paciente politraumatizado: revisão integrativa. Nursing Edição Brasileira, v. 23, n. 270, p. 4861-4872, 2020.
- MONTEIRO, A. K. C.; COSTA, C.P.V; CAMPOS, M.O.B; MONTEIRO, A.K.C. Aplicabilidade da teoria de Callista Roy no cuidado de enfermagem ao estomizado. Revista de Enfermagem Atenção à Saúde, v. 5, n. 1, p. 84-92. 2016.
- MOORHEAD, S.; JOHNSON, M.; MAAS, M. L.; SWANSON, E. NOC Classificação dos resultados de enfermagem. Elsevier Brasil, 2015.
- OLIVEIRA, M. R.; ALMEIDA, P.C; MOREIRA, T.M.M; TORRES, R.A.M. Sistematização da assistência de enfermagem: percepção e conhecimento da enfermagem Brasileira. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 72, p. 1547-1553, 2019.
- POSME, Giulio. ABCDE do trauma: atendimento ao paciente politraumatizado. SanarMed, 2020. Disponível em: <https://sanarmed.com/abcde-do-trauma-atendimento-ao-paciente-politraumatizado-posme/>. Acesso em: 17 out. 2024.
- ROSA, D. F.; CARVALHO, M. V. F.; PEREIRA, N. R. Assistência de Enfermagem à população trans: gêneros na perspectiva da prática profissional. Rev. Bras. Enferm. v. 72, supl. 1, p. 311-319, 2019. DOI: <<http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0644>>. Acesso em: 22 out. 2024.

## Capítulo 3



10.37423/241109454

# O CÂNCER DE MAMA E SUA RELAÇÃO COM CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

*FÁBIO FERREIRA DOS SANTOS*


*Universidade Federal do Rio de Janeiro  
(UFRJ)*

*ROBERTA MELQUIADES SILVA DE ANDRADE*

*Universidade Federal do Rio de Janeiro  
(UFRJ)*

*CELIA CRISTINA DIOGO FERREIRA*

*Universidade Federal do Rio de Janeiro  
(UFRJ)*



**Resumo:** De acordo com o INCA, o câncer de mama continua sendo uma das principais causas de mortalidade feminina no Brasil, com estimativa de 73.610 novos casos anuais entre 2023 e 2025, destacando a relevância de estratégias preventivas, como a modificação dos hábitos alimentares. O objetivo desta revisão de literatura foi analisar a produção científica disponível acerca do câncer de mama e sua relação com o consumo de alimentos ultraprocessados. Foi realizada uma revisão narrativa de artigos nas bases PubMed, LILACS e SciELO. Foram incluídos estudos originais e secundários, publicados nos últimos 11 anos. Os resultados sugerem que a alta ingestão de alimentos ultraprocessados, caracterizados pelo uso de aditivos artificiais, elevados teores de gordura, açúcar e sal, pode contribuir para o aumento do risco de desenvolvimento do câncer de mama, especialmente na pós-menopausa, devido ao impacto no acúmulo de gordura corporal, na resistência à insulina e no desequilíbrio metabólico. A relação entre os alimentos ultraprocessados e o câncer de mama é mediada por processos metabólicos que afetam o sistema endócrino, promovendo um ambiente favorável para o desenvolvimento de células cancerígenas. Além disso, a presença de aditivos e conservantes alimentares, como ftalatos e bisfenóis, pode atuar como desreguladores endócrinos, exacerbando o risco de câncer de mama. A adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, com a redução do consumo de alimentos ultraprocessados e a ênfase em alimentos in natura e minimamente processados, pode representar uma estratégia importante na prevenção do câncer de mama, o que traz importantes implicações para a saúde pública. No entanto, são necessárias mais pesquisas para elucidar completamente os mecanismos que envolvem o consumo desses alimentos e o risco de câncer de mama e que possam fomentar o desenvolvimento de diretrizes e ações políticas de alimentação e nutrição.

**Palavras-chave:** Neoplasia de mama; Alimentos ultraprocessados; Obesidade; Metabolismo; Desreguladores endócrinos; Prevenção.

## INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença complexa, caracterizada por múltiplas causas que levam a mutações no código genético, resultando em um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Essas células cancerosas multiplicam-se rapidamente, tendendo a ser agressivas e difíceis de controlar, o que define sua natureza maligna. No caso específico do câncer de mama, embora campanhas de rastreamento e prevenção tenham promovido uma estabilização na incidência, a doença ainda é uma das principais causas de mortalidade feminina no Brasil. Para o triênio 2023-2025, o INCA estima 73.610 novos casos anuais, reforçando a necessidade de manter ações preventivas e a detecção precoce para o controle da doença (INCA, 2023a).

Essa estabilização na incidência do câncer de mama no Brasil reflete os benefícios das campanhas de conscientização e do rastreamento contínuo, que têm aumentado o acesso à mamografia e facilitado o diagnóstico precoce, especialmente para mulheres entre 50 e 69 anos. Com uma taxa ajustada de 41,89 casos por 100.000 mulheres, o cenário estável sugere que as ações preventivas têm contribuído para o controle da doença, mesmo diante dos diversos fatores de risco que podem provocar mutações genéticas, como metais pesados, radiação, radicais livres, infecções crônicas e substâncias como tabaco, álcool e pesticidas, que alteram o ciclo celular e favorecem o desenvolvimento tumoral (INCA, 2023a; Pereira, Pardim, *et al.*, 2020).

Antes dos 35 anos a enfermidade é relativamente rara, com comum aumento progressivo de sua incidência depois dessa idade, principalmente depois dos 50 anos (Raupp *et al.*, 2017). A exposição cumulativa ao longo da vida e as mudanças biológicas relacionadas à idade geralmente aumentam esse risco (INCA, 2022b).

Nas mulheres brasileiras, o câncer de mama é o mais constante nos dias de hoje. Independentemente de décadas de políticas públicas, o índice de mortalidade da doença permanece alto no Brasil. Estudos apontam que essas taxas se mantêm altas porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados (Machado; Soares; Oliveira, 2017; Teixeira; Neto, 2020).

Por causa de aumento da prevalência do câncer de mama dentro das doenças não transmissíveis, ele virou um problema de saúde pública para o sistema de saúde brasileiro, o que exige intervenções vinculadas a tecnologias leves, leve-duras e duras, que são diferentes tipos de intervenções e ferramentas tecnológicas utilizadas para diagnósticos, tratamento e monitoramento de pacientes, simultaneamente a mudanças de estilo de vida (Machado; Soares; Oliveira, 2017).

A relação entre alimentos ultraprocessados e o câncer de mama pode ser atribuída, em parte, à alta quantidade de calorias e energia que esses produtos contêm, em contraste com sua escassa qualidade nutricional. Esse desequilíbrio pode promover o desenvolvimento de excesso de gordura corporal e obesidade, que são fatores de risco conhecidos para o câncer de mama (Monteiro *et al.*, 2017). Além disso, em pessoas já diagnosticadas com câncer, a ingestão excessiva desses alimentos pode agravar o quadro clínico, potencializando o ganho de peso e comprometendo o controle da doença. O consumo de alimentos ultraprocessados pode influenciar negativamente o metabolismo, aumentar a inflamação sistêmica e favorecer o crescimento tumoral, tornando mais difícil o gerenciamento do câncer e a manutenção da saúde geral do paciente (Fiolet *et al.*, 2018).

Esses alimentos contêm ingredientes como conservantes, corantes artificiais, emulsificantes, adoçantes, ftalatos, bisfenóis, nitratos e nitritos, que podem ter efeitos adversos à saúde e, quando consumidos em grandes quantidades e de forma prolongada, aumentam o risco de câncer (Deus Mendonça *et al.*, 2016; Gultekin, 2015). Além disso, aditivos alimentares presentes nesses produtos, quando expostos desde a puberdade, têm o potencial de atuar como agentes perturbadores endócrinos, aumentando ainda mais o risco de desenvolvimento de câncer (Poulsen *et al.*, 2018; Tumminia *et al.*, 2019).

As alterações metabólicas à obesidade influenciam o desenvolvimento do câncer, pois os desreguladores endócrinos promovem o ganho de peso alterando ou reprogramando elementos-chave do sistema endócrino que controlam o metabolismo, o balanço energético e o apetite, levando à obesidade e seus efeitos negativos à saúde (Pimenta *et al.*, 2022).

O excesso de alimentos ultraprocessados na alimentação pode ser alarmante e merece investigação (Fiolet *et al.*, 2018). Uma alimentação saudável de acordo com as necessidades nutricionais de cada paciente deve fornecer todos os nutrientes necessários para manter ou restabelecer seu estado nutricional, garantir uma melhor qualidade de vida e assim contribuir para menos complicações no tratamento e prevenção de novas recidivas (Moreira *et al.*, 2019).

A nutrição é um dos aspectos mais modificáveis do estilo de vida, e as escolhas alimentares podem afetar a saúde e o risco de câncer. Estratégias ativas, incluindo intervenções educacionais/comportamentais, são necessárias em populações de alto risco para promover hábitos alimentares saudáveis, tendo em vista os efeitos deletérios que os alimentos ultraprocessados podem causar no organismo, principalmente de pacientes com câncer. Por isto, este estudo tem como

objetivo analisar a produção científica disponível acerca do câncer de mama e sua relação com o consumo de alimentos ultraprocessados.

## REVISÃO DA LITERATURA

### EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE MAMA (CM).

O câncer de mama (CM) é um tipo de câncer que se desenvolve nas células da mama. É o tipo mais comum de câncer entre as mulheres, embora possa ocorrer em homens. O câncer de mama ocorre quando as células anormais na mama se multiplicam de maneira descontrolada, formando um tumor (INCA, 2022c).

Menciona-se que fatores financeiros e educacionais, melhoria de qualidade de vida, melhores salários e a genética da mulher atuam de modo direto na ocorrência da enfermidade (Leite; Gomes; Ferreira *et al.*, 2021). Esse tipo de câncer afeta os homens, mas com baixa incidência, em apenas 1% do total de casos de doença (INCA, 2022d).

Um fator a ser observado na da epidemiologia da enfermidade é a idade, já que o envelhecimento é uma das fundamentais razões de risco para o CM, pois a interferência negativa da anomalia acontece à medida que as mulheres chegam à maior idade, com cerca de 40 a 79 anos (Ferreira *et al.*, 2021).

A incidência global de câncer está em constante crescimento, prevendo-se um aumento dos casos de 19,3 para 28,4 milhões até o ano de 2040. O câncer representa uma em cada seis mortes em nível mundial e superou as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte prematura em países de alta renda. No entanto, pelo menos metade dos casos de câncer poderiam ser evitados, e um dos fatores modificáveis de risco é uma alimentação não saudável (Chang *et al.*, 2023). No Brasil, o câncer tem se tornado a principal causa de morte em alguns municípios, superando as doenças cardiovasculares, especialmente nas grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o câncer já ultrapassou outras doenças como as cardiovasculares no número de óbitos, de acordo com dados recentes do, Informação sobre Mortalidade (SIM) (INCA, 2023a; SIM, 2024).

No ponto de vista mundial, o câncer de pele não melanoma é a classe que mais afeta o sexo feminino e, em sequência o CM. A neoplasia mamária dispõe maior existência com mais de 2 milhões de diagnósticos por ano (Gomes, 2021). Mudanças contínuas na população mundial e na epidemiologia prenunciam um aumento na carga de câncer nas próximas décadas, especialmente em países de baixa e média renda (Ferlay *et al.*, 2012)

O Instituto Nacional de Câncer José Gomes da Silva (INCA) prevê que, entre 2023 e 2025, o Brasil registrará cerca de 704 mil novos casos de câncer anualmente, sendo aproximadamente 73.610 casos de câncer de mama em mulheres por ano. A maioria desses casos ocorrerá nas regiões Sul e Sudeste, que concentrarão cerca de 70% dos casos estimados, com uma incidência de 84,5/100 mil mulheres no Sudeste e 75,0/100 mil mulheres no Sul. Em contrapartida, as regiões Norte e Nordeste terão taxas de incidência significativamente mais baixas, com 25,0/100 mil mulheres no Norte e 54,0/100 mil mulheres no Nordeste. No Centro-Oeste, a taxa de incidência de câncer de mama é estimada em 58,0/100 mil mulheres (INCA, 2023a).

A existência de dados comprobatórios sobre se o aumento da população com câncer é primariamente resultados de melhorias nas políticas públicas,

incluindo maior acesso à saúde para mulheres, não é confirmada. Essas políticas podem estar estimulando mais pessoas a buscarem assistência médica, o que por sua vez permite mais diagnósticos (Leite, 2021).

Quanto ao tempo de vida após o diagnóstico, esta doença, assim como outras enfermidades, tem uma probabilidade maior de cura quando diagnosticada precocemente. O tratamento adequado e direcionado a ela também tem um impacto positivo na sobrevida, com a disponibilidade de recursos técnicos e farmacêuticos aumentam as chances de regressão das células cancerosas e uma cura mais rápida (Leite, 2021).

Diante dessa perspectiva, o CM é considerado um problema de saúde pública que precisa ser abordado em termos de prevenção, cujas estratégias devem ser baseadas em um melhor conhecimento factual dos fatores que aumentam ou diminuem os riscos de desenvolver câncer, a fim de promover o acesso ao tratamento (Latino-Martel *et al.*, 2016).

### **Fatores causais do câncer de mama**

#### **Fatores não modificáveis**

O CM é uma doença com várias formas, cujo surgimento é influenciado por diversos elementos. A idade é um dos principais fatores que determinam sua ocorrência (Sugano *et al.*, 2020). Além disso, fatores hormonais e o histórico reprodutivo também desempenham um papel significativo (Van Denbrandt *et al.*, 2021). Algumas situações de câncer de mama estão ligadas a fatores genéticos ou hereditários (Sato; Matsumoto, 2020).

A idade tem sido descrita como um importante fator de risco, com um rápido aumento da incidência nos anos pré-menopausa, seguido de um aumento lento nos anos de menopausa. O sexo feminino e a idade avançada são os fatores de risco mais importantes para CM. No Brasil, em cada cinco mulheres diagnosticadas com CM, 4 têm 50 anos ou mais, já mulheres com menos de 40 anos tem baixa incidência de desenvolverem o CM (Sugano *et al.*, 2020).

Outros fatores de riscos importantes para o CM estão associados às flutuações hormonais durante a vida, com maior exposição ao estrogênio e progesterona aumentando o risco de desenvolver câncer de mama (Van Den brandt *et al.*, 2021).

O CM hereditário ou familiar é responsável por 5-10% dos casos, e os genes afetados principalmente por mutações germinativas são os genes BRCA1 e BRCA2. Estas mutações representam um quarto dos casos de câncer de mama hereditário, estão associadas ao diagnóstico precoce, são bilaterais e, podem aumentar em até 75% o risco de desenvolver a doença ao longo da vida (Kaminska *et al.*, 2015; Baretta *et al.*, 2016).

Sabe-se que ele tem várias causas conhecidas, como o histórico de hiperplasias mamárias, mutações nos genes BRCA1 e 2, histórico familiar de CM e/ou ovário, menarca precoce (antes dos 12 anos), menopausa tardia (após os 50 anos), primeira gestação tardia, ausência ou reduzido período de gestação e amamentação, uso prolongado de terapia hormonal de reposição com estrogênio e progesterona (Sato; Matsumoto, 2020).

### **Fatores causais modificáveis**

Um estilo de vida sedentário combinado a uma alimentação desequilibrada, caracterizada por uma alta quantidade de gorduras saturadas e uma baixa ingestão de nutrientes essenciais, são fatores que podem aumentar a probabilidade de desenvolvimento da doença de CM (Bravo *et al.*, 2021); (Trabaquini; Manzan; Gasparin, 2022). É crucial evitar o consumo de tabaco, já que também constitui um fator de risco significativo (Macacu *et al.*, 2015), assim como o abuso de álcool (Latino-Martel *et al.*, 2016). Ademais, a obesidade tem sido identificada como um contribuinte importante para o surgimento dessa doença (Pimenta *et al.*, 2022). A exposição a hormônios exógenos é outra questão relevante que pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento da doença de CM (Sato; Matsumoto, 2020).

As causas de risco modificáveis são aquelas que podem ser revertidas ou mitigadas por meio de mudanças no estilo de vida e educação. Estima-se que um número próximo de 20% das mortes por

câncer de mama em todo o mundo, sejam atribuídas a esses fatores (18% em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, 27% em países desenvolvidos) (Gomes *et al.*, 2020).

Os principais motivos de risco mutáveis associados ao CM incluem dieta especialmente baseadas em carboidratos simples e alimentos industrializados, que estão associadas a uma alimentação pobre em fibras e antioxidantes, rica em carne vermelha (Buja *et al.*, 2020) e falta de atividade física (Matthews *et al.*, 2020). Outros fatores estão relacionados ao aumento do balanço energético (Brown; Ligibel, 2018; Ligibel; Basen-Engquist; Bea, 2019).

O cigarro contém substâncias químicas tóxicas, como alcatrão, benzeno, amônia, arsênico, nicotina e formaldeído, que causam mutações no DNA das células e podem levar ao câncer (Macacu *et al.*, 2015). Essas substâncias são poderosos agentes carcinogênicos que danificam o material genético das células e favorecem o desenvolvimento de câncer, incluindo o câncer de mama. A ingestão de álcool pode afetar os níveis corporais de hormônios, incluindo o estrogênio, que pode estimular o crescimento de células tumorais de câncer de mama. O álcool também pode contribuir para o aumento da produção de substâncias carcinogênicas no organismo, como os acetatos, que têm um efeito genotóxico, exacerbando o risco de desenvolvimento do câncer (Latino-Martel *et al.*, 2016).

Excesso de peso corporal, incluindo sobrepeso e obesidade, tem sido associado a um maior risco de CM em mulheres pós-menopausa, o acúmulo de gordura na região abdominal, também conhecido como obesidade central, tem sido associado a um risco ainda maior de desenvolver CM em mulheres pós-menopausa. A gordura abdominal produz hormônios e substâncias inflamatórias que podem estimular o crescimento de células cancerígenas (Fang *et al.*, 2018).

O estrogênio, por exemplo, é produzido em maior quantidade pelas células de gorduras e pode promover o crescimento de tumores mamários sensíveis a esse hormônio. Além disso, com o aumento alarmante das taxas de obesidade observado nos últimos anos, a gordura corporal merece um papel significativo nesse cenário (Fang *et al.*, 2018).

#### RELAÇÃO ENTRE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS E CÂNCER DE MAMA.

Os alimentos ultraprocessados são produtos alimentícios que passam por diversos processos industriais, contendo ingredientes artificiais e aditivos químicos, além de terem alto teor de açúcar, sal e gordura. Esses alimentos são tipicamente encontrados em embalagens prontas para consumo (Silva, 2019).

A classificação NOVA dos alimentos é um sistema de classificação de alimentos que foi desenvolvido para avaliar a qualidade nutricional dos alimentos e bebidas com base na extensão e propósito do processamento industrial ao qual foram submetidos. O sistema de classificação NOVA divide os alimentos em quatro categorias: (Silva, 2019).

1. Alimentos não processados ou minimamente processados: são alimentos que não foram modificados por processos industriais e que se assemelham aos alimentos na sua forma natural, como frutas, verduras, cereais, leguminosas, carnes frescas, ovos e leite. De acordo com o Guia alimentar para a população brasileira a maioria dos alimentos que devemos consumir diariamente devem pertencer a este grupo (Silva, 2019).

2. Ingredientes culinários processados: são alimentos que foram submetidos a processos como moagem, trituração, prensagem e refinação para torná-los mais fáceis de usar na cozinha, como farinha, óleos, açúcares e sal.

3. Alimentos processados: são alimentos que foram modificados com a adição de sal, açúcar, óleos ou outros ingredientes para melhorar o sabor, a textura ou a estabilidade do produto, como pães, queijos, salames, conservas, frutas em calda, iogurtes adoçados e sucos de frutas adoçados.

4. Alimentos ultraprocessados: são alimentos que passaram por múltiplos processos industriais, contêm vários ingredientes e aditivos, e são projetados para serem convenientes e saborosos, como refrigerantes, salgadinhos, biscoitos, sopas instantâneas, cereais matinais açucarados, pizzas congeladas, hambúrgueres e nuggets de frango (Silva, 2019).

A classificação NOVA é útil para avaliar a qualidade nutricional dos alimentos e para incentivar escolhas alimentares saudáveis. Alimentos não processados ou minimamente processados são geralmente mais nutritivos do que alimentos ultraprocessados, que tendem a ser ricos em açúcares, gorduras e aditivos alimentares (Silva, 2019).

A conexão entre o consumo de alimentos ultraprocessados e condições como obesidade e doenças crônicas tem sido extensivamente examinada por pesquisadores (Louzada et al., 2015; Monteiro et al., 2018; Blanco-Rojo et al., 2019). A possível ligação entre alimentos ultraprocessados e CM pode ser atribuída, de maneira indireta, à característica desses produtos de possuírem uma alta quantidade de calorias, mas baixo teor nutricional (Monteiro et al., 2017), causando o aumento da obesidade e o acúmulo excessivo de gordura corporal (Poti et al., 2017; Blanco-Rojo et al., 2019).

Alimentos ultraprocessados estão diretamente relacionados ao aumento do risco de CM devido à presença de aditivos e conservantes com potencial cancerígeno. Além disso, esses produtos podem conter contaminantes tóxicos migrados de embalagens, como ftalatos e bisfenóis, que são desreguladores endócrinos comumente encontrados em materiais de armazenamento. Essas substâncias interferem no equilíbrio hormonal do organismo, elevando o risco de desenvolvimento do CM (Chang *et al.*, 2023).

Desempenham um papel importante na promoção da obesidade e no acúmulo excessivo de gordura corporal, fatores amplamente reconhecidos como determinantes para o câncer (Tumminia *et al.*, 2019). Para indivíduos já diagnosticados com câncer, a exposição a esses compostos pode agravar o quadro clínico, interferindo no metabolismo e dificultando o controle da doença, ao promover resistência ao tratamento e favorecer o crescimento tumoral (Gultekin, 2015).

De igual modo, os alimentos altamente processados contêm ingredientes que estimulam o desenvolvimento de câncer (Gultekin, 2015), ou substâncias adicionadas aos alimentos que atuam como agentes perturbadores cancerígenos devido à exposição contínua desde a fase da puberdade (Poulsen *et al.*, 2018), como os conservantes (ex: nitritos e nitratos), corantes artificiais (ex: aminas aromáticas), emulsificantes (ex: polissorbatos), adoçantes (ex: aspartame), ftalatos, bisfenóis e outros compostos químicos presentes em embalagens e materiais de armazenamento. Esses ingredientes podem alterar a função endócrina e promover o desenvolvimento de células cancerígenas (Tumminia *et al.*, 2019).

Foi constatado, por meio da análise de uma amostra de 14.378 participantes da coorte ELSA-BRASIL, que o consumo de alimentos ultraprocessados foi mais elevado entre aqueles que possuem melhores condições socioeconômicas e demográficas, como maior renda e escolaridade (Silva, 2019). Dessa forma, o padrão alimentar de pessoas com maior renda e escolaridade, ao consumir mais alimentos ultraprocessados, pode contribuir para fatores de risco como obesidade, resistência à insulina e desequilíbrios hormonais, que são amplamente reconhecidos como determinantes do câncer, incluindo o CM (Monteiro *et al.*, 2017; Gultekin, 2015).

A revisão de literatura conduzida por Thoene *et al.* (2020) indica que a exposição ao bisfenol, causa danos ao DNA e/ou enfraquece o sistema imunológico. Além disso o bisfenol S (BPS), pode promover acúmulo de lipídios e aumento dos níveis de proteína para vários marcadores adipogênicos. O BPS está relacionado à diferenciação de células pré-adiposas por meio da via do receptor- $\gamma$  ativado por

proliferador de peroxissoma (PPARG), fator de transcrição que regula a homeostase da glicose, metabolismo de lipídeos e inflamação, o que pode favorecer o desenvolvimento do CM.

## CONCLUSÃO

O câncer de mama continua sendo uma das principais causas de mortalidade feminina no Brasil, e os fatores alimentares têm sido cada vez mais reconhecidos como influentes no risco de sua ocorrência. Estudos recentes sugerem que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, açúcares, sal e aditivos químicos, pode aumentar esse risco, especialmente em mulheres pós-menopausa. Esses alimentos estão diretamente associados a alterações metabólicas, como o aumento da gordura corporal, resistência à insulina e desequilíbrios hormonais — fatores que criam um ambiente favorável ao desenvolvimento de células cancerígenas (Monteiro et al., 2017; Fiolet et al., 2018). Além disso, a presença de substâncias como ftalatos e bisfenóis, encontrados em embalagens de alimentos, tem mostrado potencial para agir como desreguladores endócrinos, aumentando ainda mais o risco de câncer de mama (Poulsen et al., 2018).

A adoção de uma alimentação mais saudável, baseada em alimentos frescos e minimamente processados, é uma estratégia fundamental para a prevenção do câncer de mama. A redução do consumo de alimentos ultraprocessados pode não só diminuir o risco de desenvolvimento da doença, mas também promover melhorias na saúde geral das mulheres, especialmente aquelas em fases de maior risco, como a pós-menopausa (Monteiro et al., 2017).

Além disso, mudanças alimentares podem contribuir para a redução da obesidade, da resistência à insulina e de outros fatores de risco, criando um ambiente corporal menos propício à formação de tumores malignos. Estudos sugerem que, por meio de escolhas alimentares mais conscientes, é possível prevenir até 30% dos casos de câncer de mama, destacando o impacto positivo das mudanças dietéticas na redução de riscos associados à doença (Louzada et al., 2020).

No entanto, é essencial que mais estudos sejam realizados para esclarecer os mecanismos biológicos exatos que envolvem a relação entre dieta e câncer de mama. Tais pesquisas permitirão embasar políticas públicas mais eficazes e estratégias de intervenção nutricional direcionadas. Dessa forma, um esforço conjunto entre cientistas, profissionais de saúde e autoridades públicas será crucial para a implementação de medidas preventivas robustas e para a promoção da saúde feminina. A conscientização sobre a importância da alimentação saudável pode ser um passo significativo na luta contra o câncer de mama e na melhoria da qualidade de vida das mulheres.

## REFERÊNCIAS

- BARETTA, Z. *et al.* Effect of BRCA germline mutations on breast cancer prognosis: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (United States)*, v. 95, n. 40, 2016.
- BLANCO-ROJO, R. *et al.* Consumption of Ultra-Processed Foods and Mortality: A National Prospective Cohort in Spain. *Mayo Clinic Proceedings*, v. 94, n. 11, p. 2178–2188, 2019.
- BRAVO, B. S. *et al.* Câncer de mama: uma revisão de literatura/ Breast cancer: a literature review. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 3, p. 14254–14264, 2021.
- BROWN, J. C.; LIGIBEL, J. A. “Introdução Atividade física”. 2018.
- BUJA, A. *et al.* Breast cancer primary prevention and diet: An umbrella review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 13, p. 1–54, 2020.
- CHANG, K. *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados, risco de câncer e mortalidade por câncer: uma análise prospectiva em larga escala no UK Biobank. *eClinicalMedicine*, v. 56, p. 1–12, 2023.
- FANG, X. *et al.* Quantitative association between body mass index and the risk of cancer: A global Meta-analysis of prospective cohort studies. *International Journal of Cancer*, v. 143, n. 7, p. 1595–1603, 2018.
- FERLAY, J. *et al.* Incidência e mortalidade por câncer no mundo : fontes , métodos e principais padrões no GLOBOCAN 2012 passou pelo processo de edição , tipografia , paginação e revisão , o que pode levar a. 2012.
- FERREIRA, Samuel Silva et al. Indicações de exames de ressonância magnética das mamas em um centro de referência no diagnóstico e tratamento de câncer de mama no Brasil. *Revista de Radiologia Brasileira*, v. 54, n. 2, 2021.
- GOMES, P.; LOPES, F.; LIMA, T. DE. Significados da Dor Crônica na Sobrevivência ao Câncer de Mama. v. 67, n. 1, p. 1–8, 2021.
- INCA – INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Tipos de câncer: câncer de mama. Câncer de mama, 2022a. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama>>. Acesso em: 21 jul. 2022.
- INCA – INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Controle de câncer de mama: fatores de risco. Câncer de mama, 2022b. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/controle-de-cancer-de-mama/fatores-de-risco>>. Acesso em: 21 jul. 2022.
- INCA – INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Inca estima 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025. Assuntos. Notícias, 2022c. Disponível em: <<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2022/inca-estima-704-mil-casos-de-cancer-por-ano-no-brasil-ate-2025>>. Acesso em: 19 dez. 2022.
- INCA – INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2023d. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

KAMIŃSKA, M. *et al.* Breast cancer risk factors. *Przegląd Menopauzalny*, v. 14, n. 3, p. 196–202, 2015.

LATINO-MARTEL, P. *et al.* Alcoholic beverages, obesity, physical activity and other nutritional factors, and cancer risk: A review of the evidence. *Critical Reviews in Oncology/Hematology*, v. 99, p. 308–323, 2016.

LEITE, G. C. CORRELAÇÃO ENTRE TEMPO DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E SOBREVIVÊNCIA EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. *COLLOQUIUM VITAE*, v. 13, n. 1, p. 12–16, 2021.

LIGIBEL, J. A.; BASEN-ENGQUIST, K.; BEA, J. W. Controle de peso e atividade física para prevenção e controle do câncer de mama. p. 22–33, 2019.

MACACU, A. *et al.* Active and passive smoking and risk of breast cancer: a meta-analysis. *Breast Cancer Research and Treatment*, v. 154, n. 2, p. 213–224, 2015.

MATTHEWS, C. E. *et al.* Amount and intensity of leisure-time physical activity and lower cancer risk. *Journal of Clinical Oncology*, v. 38, n. 7, p. 686–698, 2020.

MATSUMOTO, L. S. D. L. INGESTÃO DE NUTRIENTES, PERFIL LIPÍDICO E INDICADORES DE ADIPOSIDADE DE MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA SUBMETIDAS A SEIS MESES DE TREINAMENTO PRESENCIAL E HOME-BASED ALIADOS À ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. n. D, p. 62 f., 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Brasília, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/sistema-de-informacoes-sobre-mortalidade-sim>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

MONTEIRO, C. A. *et al.* Produtos ultraprocessados estão se tornando dominantes no sistema alimentar global. v. 14, p. 21–28, 2018.

PEREIRA, M. G. *et al.* Consumption of ultra-processed foods and associated factors in adults: Evidence from the 2008-2009 campinas health survey. *Ciência e Saúde Coletiva*, v. 26, p. 3815–3824, 2021.

CHANG, K. *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados, risco de câncer e mortalidade por câncer: uma análise prospectiva em larga escala no UK Biobank. *eClinicalMedicine*, [s.l.], v. 56, p. 1–12, 2023. ISSN: 25895370, DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.101840.

DEUS MENDONÇA, R. DE *et al.* Ultraprocessed food consumption and risk of overweight and obesity: The University of Navarra Follow-Up (SUN) cohort study. *American Journal of Clinical Nutrition*, [s.l.], v. 104, no 5, p. 1433–1440, 2016. ISSN: 19383207, DOI: 10.3945/ajcn.116.135004.

GULTEKIN, F. Food Additives of Public Concern for their Carcinogenicity.

*Journal of Nutritional Health & Food Science*, [s.l.], v. 3, no 4, p. 01–06, 2015. DOI: 10.15226/jnhfs.2015.00149.

MONTEIRO, C A *et al.* Produtos ultraprocessados estão se tornando dominantes no sistema alimentar global. [s.l.], v. 14, p. 21–28, 2013. DOI: 10.1111/obr.12107.

MONTEIRO, Carlos Augusto *et al.* Commentary The UN Decade of Nutrition , the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. [s.l.], 2017. DOI: 10.1017/S1368980017000234.

PEREIRA, I. D. M.; PARDIM, S.; GENARO, S. C. MAMA EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. [s.l.], v. 12, no 3, p. 26–36, 2020. DOI: 10.5747/cv.2020.v12.n3.v307.

POULSEN, R. *et al.* Nitrate: An Environmental Endocrine Disruptor? A Review of Evidence and Research Needs. *Environmental Science and Technology*, [s.l.], v. 52, no 7, p. 3869–3887, 2018. ISSN: 15205851, DOI: 10.1021/acs.est.7b06419.

SATO, Luciana Sato de Lima e MATSUMOTO, David L. *Luciana Sato De Lima Matsumoto*. [S.l.], p. 62, 2020.

SILVA, C. L. Da. Consumo De Alimentos Ultraprocessados Por Mulheres Com Câncer De Endométrio. [s.l.], v. 1, no Junho, p. 82, 2019.

TUMMINIA, A. *et al.* Adipose tissue, obesity and adiponectin: Role in endocrine cancer risk. *International Journal of Molecular Sciences*, [s.l.], v. 20, no 12, 2019. ISSN: 14220067, DOI: 10.3390/ijms20122863.

MATSUMOTO, Luciana Sato de Lima e SATO, Luciana Sato de Lima; MATSUMOTO, David L. INGESTÃO DE NUTRIENTES, PERFIL LIPÍDICO E INDICADORES DE ADIPOSIDADE DE MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA SUBMETIDAS A SEIS MESES DE TREINAMENTO PRESENCIAL E HOME-BASED ALIADOS À ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. [S.l.]: Editora, 2020. p. 62.

SUGANO, T. *et al.* Prognostic impact of ACTN4 gene copy number alteration in hormone receptor-positive, HER2-negative, node-negative invasive breast carcinoma. *British Journal of Cancer*, v. 122, n. 12, p. 1811–1817, 2020.

TRABAQUINI, L.; MANZAN, V.; GASPARIN, F. A CORRELAÇÃO ENTRE OBESIDADE E CÂNCER DE MAMA E O POSSÍVEL IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NESSAS COMORBIDADES. *ENCICLOPÉDIA BIOSFERA*, v. 19, n. 40, 30 jun. 2022.

VAN DEN BRANDT, P. A. *et al.* Body size and weight change over adulthood and risk of breast cancer by menopausal and hormone receptor status: a pooled analysis of 20 prospective cohort studies. *European Journal of Epidemiology*, v. 36, n. 1, p. 37–55, 2021.

# Capítulo 4



10.37423/241109458

## APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM A PESSOA POLITRAUMATIZADA À LUZ DE LEVINE

*Karen de Moura Rolim Santos*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Yasmin Pinheiro Figuêredo*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Manuela Costa Freitas*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Caroline Barbosa da Silva Porto*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Andressa de Souza Batista*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Ingred Conceição Araújo*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Paulo Brenno Sampaio Lima*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Brena de Jesus Rios Xavier*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Izabela Bastos Silva dos Santos*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

*Nicolle Paiva Gomes*

*Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS*

**Resumo:** **Introdução:** A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma ferramenta que organiza o trabalho da enfermeira, proporcionando um cuidado individualizado e eficiente ao paciente, fundamentado no Processo de Enfermagem. A teoria de Myra Estrin Levine complementa essa abordagem, focando na adaptação do paciente ao ambiente, considerando-o em suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais, especialmente em casos complexos como politraumas. **Objetivos:** Descrever o processo de enfermagem a pessoa politraumatizada à luz de Myra Levine. **Método:** Trata-se de um estudo do tipo qualitativo de abordagem descritiva e exploratória na modalidade de caso clínico, vivenciado durante o período prático do componente curricular Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, no período de Outubro de 2024, na Clínica Ortopédica, no Hospital Geral Clériston Andrade. **Resultados:** Apresentam-se, como resultados, os diagnósticos de Enfermagem, as intervenções sob a ótica da Teoria da Conservação e a prescrição de Enfermagem. **Discussões:** A aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em pacientes politraumatizados, baseada na Teoria Holística de Myra Levine, promove um cuidado integral, abordando as lesões físicas e os impactos emocionais, sociais e psicológicos. Com seus quatro princípios de conservação – energia, integridade estrutural, pessoal e social – oferece uma estrutura eficaz para guiar o cuidado em contextos complexos como o politraumatismo. **Considerações finais:** Este estudo de caso destaca a importância da SAE, associada à teoria holística de Myra Levine, no cuidado de pacientes politraumatizados, promovendo uma recuperação mais rápida e eficaz. O uso do curativo de Figueiredo, otimiza o tratamento, prevenindo complicações e melhorando a qualidade de vida. A abordagem holística do enfermeiro, considerando as necessidades físicas, emocionais e sociais do paciente, promove um cuidado contínuo e personalizado, resultando em melhores estudos clínicos e impacto na busca pela saúde do paciente.

**Palavras-chave:** Sistematização da assistência de enfermagem; Politraumatismo; Figueiredo; Curativo; Feridas.

## INTRODUÇÃO

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), desenvolvida em 1970, é uma ferramenta de extrema relevância para a organização do trabalho da enfermeira e a partir da sua aplicação é possível prestar um cuidado de enfermagem individualizado e efetivo, levando em consideração as reais necessidades do paciente, de maneira singular e é um modelo sistemático privativo do enfermeiro, conforme a lei 7.498/86 do exercício profissional. Alinhado a isso, o Processo de Enfermagem é o método de trabalho utilizado para garantir que a SAE tenha sua aplicabilidade. Juntos, esse profissional tem sua autonomia assegurada, além de agilizar os serviços que são executados durante a assistência e certificar-se da execução de um plano de cuidados de forma correta e resolutiva (Cardoso *et al.*, 2021).

A SAE é composta por 5 etapas contínuas, que perpassam todo o cuidado de enfermagem prestado ao paciente, principalmente em ambiente hospitalar, mas também deve ser aplicada na atenção primária à saúde e em serviços de média complexidade. São elas: Avaliação de Enfermagem, no qual realiza-se a anamnese com o paciente, de forma subjetiva, objetivando conhecê-lo, entender sua história clínica, histórico familiar, dentre outras perguntas que vão nortear as outras etapas do cuidado. Além disso, o exame físico também deve ser realizado com base no que é preconizado nas evidências científicas, a fim de encontrar achados clínicos importantes. Outra etapa são os diagnósticos de enfermagem, no qual os dados coletados na primeira fase serão interpretados e organizados, conforme os problemas que foram detectados nessa análise inicial. Em seguida, o cuidado será planejado, tendo em vista o que foi diagnosticado e o que necessita ser solucionado pelo enfermeiro (Planejamento de Enfermagem). A partir do planejamento e da execução partindo do que foi proposto (Intervenções), espera-se que um resultado seja alcançado, pois dessa forma é possível avaliar a qualidade da assistência, bem como o que precisa ser melhorado, através da última etapa: a Evolução (Cofen, 2024).

Dessa forma, as etapas da SAE possuem uma continuidade e estão diretamente relacionadas, garantindo que o paciente terá assistência do momento da sua entrada ao serviço (admissão) até o momento de sua saída (alta) e permitindo ao enfermeiro o desenvolvimento do raciocínio clínico, de acordo com evidências científicas e a organização da equipe de enfermagem, uma vez que é o profissional responsável por liderar e gerenciar o trabalho. Assim, essa ferramenta deve ser utilizada em todos os serviços de saúde, em qualquer situação que acometa o cliente, a fim de proporcionar

melhora na qualidade assistencial e efetividade do cuidado prestado não só ao paciente, mas também à família e comunidade, atentando-se para as necessidades subjetivas do indivíduo.

As práticas de enfermagem são embasadas em diversas teorias, dentre elas, a Teoria Holística de Enfermagem de Myra Estrin Levine (1967), que expressa o indivíduo como um ser complexo e dinâmico e o ambiente que ele está presente também dinâmico, ou seja, o homem possui a capacidade de se adaptar ao lugar e vice-versa, de modo que os dois interagem. Além disso, o paciente inserido na assistência de enfermagem deve ser visto como um todo, que tem suas individualidades biológicas, psíquicas, sociais, culturais, religiosas, entre outros, o que deve direcionar a maneira com a qual a assistência deve ser prestada (Fagundes, 1983).

De acordo com Levine, o indivíduo se adapta ao ambiente em que está presente (estar hospitalizado, por exemplo) e o enfermeiro deve exercer o papel de auxiliar o cliente a se adaptar às mudanças do ambiente e a condição clínica a que está submetido. Somado a isso, a adaptação também gera fatores estressores no paciente, causando desequilíbrios que alteram o funcionamento do comportamento do organismo humano. Esse profissional deve estar atento a essa situação e estar preparado para transformar esse cenário, através de ações presentes na assistência que mantenham o paciente melhor adaptado a sua situação e dependente das relações interpessoais que contribuem para a humanização do cuidado ofertado. (Ferreira; Macedo, 2016).

Assim, a teoria de Myra é pautada em quatro conceitos fundamentais que dizem respeito a todo o enfrentamento que o paciente necessita ter. O primeiro é a conservação da energia, que aborda acerca do gasto adicional energético do cliente em virtude de desequilíbrios metabólicos; o segundo, a conservação da integridade estrutural do paciente trata sobre a minimização da extensão do dano para, dessa maneira, propiciar melhor adaptação do indivíduo. A conservação da integridade pessoal atenta-se para as crenças, valores, atitudes e tudo o que se refere àquela pessoa, ou seja, cada um tem sua própria subjetividade e há uma escolha de dividir essas questões com terceiros ou não, o que afeta sua privacidade. (Moreira *et al.*, 2022).

No que tange ao último conceito, a conservação da integridade social do paciente, é fundamental ter o entendimento que o indivíduo é um ser social e necessita da manutenção do convívio, tanto com o meio em que vive, como com a família. Logo, todos esses fundamentos da teoria holística precisam ser inseridos na prática clínica, com o objetivo de prestar uma assistência qualificada e, principalmente, respeitosa, pois cada pessoa é um ser biopsicossocial munido de diversas

particularidades que precisam ser respeitadas e analisadas para permitir a adaptação do cliente ao ambiente, seja ele ambulatorial, hospitalar ou outro (Moreira *et al.*, 2022).

Por conseguinte, a partir do conhecimento dessa teoria e dos cuidados prestados na assistência de enfermagem, foi possível relacionar os fatos existentes com foco na tese holística centrada na pessoa politraumatizada em uso de curativo de Figueiredo. Em se tratando disso, o politraumatismo se configura como uma síndrome multissistêmica, visto que pode acometer diversos órgãos e sistemas vitais por várias lesões consecutivas. Dessa maneira, pode haver algumas injúrias ao indivíduo, como hemorragia, instabilidade hemodinâmica, fraturas e dor intensa. Pode-se, também, classificar o politrauma como duas ou mais regiões que são atingidas por determinado evento, geralmente acidentes automobilísticos (Gomes *et al.*, 2023). Segundo estudo realizado pela Fundação Dom Cabral (FDC), em 2023, houve um aumento de 12,6% na taxa de casos de acidentes de trânsito com feridos, o que pode resultar em múltiplas lesões e politraumas.

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no Brasil, a cada ano, 33 mil pessoas vão a óbito e outros 400 mil ficam inválidos ou feridos em decorrência de acidentes de trânsito, na maioria das vezes são vítimas de politraumatismo. Por conta disso, demanda rápido atendimento ainda antes de chegar ao hospital, o atendimento intra-hospitalar, que estabiliza o paciente e inicia as medidas de suporte básico vital e quando chega ao serviço de referência indicado, adentra diretamente para dar continuidade aos cuidados e impedir maiores agravos, visto que se configura como uma situação em que o atendimento deve ser imediato (emergência) (Schossler; Lohmann; Pissaia, 2020).

Portanto, afirma-se que o politrauma perpassa a condição física do paciente, mas também gera impactos na saúde mental, nos processos familiares, na espiritualidade e identidade pessoal, o que demanda que, de fato, a assistência prestada considere o indivíduo como um ser biopsicossocial, que necessita de cuidados integrais e que deve se adaptar ao contexto de vida ao qual está sendo submetido e ao ambiente, tendo o enfermeiro o papel de auxiliador nesses quesitos. Assim, objetiva-se com o presente estudo de caso trabalhar a aplicabilidade da sistematização da assistência de enfermagem em um estudo de caso voltado ao cuidado com o paciente politraumatizado pautada na teoria holística de Myra Estrin Levine.

## OBJETIVO

Descrever o processo de enfermagem a pessoa politraumatizada à luz de Myra Levine.

## METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo qualitativo de abordagem descritiva e exploratória na modalidade de caso clínico, no qual visa revelar as múltiplas dimensões da condição humana e entender suas necessidades, fundamentando-se em um cuidado assistencial de modo a integrar a teoria vista no contexto acadêmico à prática no âmbito laboral (Guerrero-Castanêda *et al*, 2017).

Elaborado por estudantes da graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), o estudo foi vivenciado durante o período prático do componente curricular Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso II, no período de Outubro de 2024, na Clínica Ortopédica, no Hospital Geral Clériston Andrade, localizado em Feira de Santana, interior do estado da Bahia, o qual se caracteriza como um hospital porta aberta, de grande porte, sendo a maior unidade pública hospitalar da rede própria do interior do Estado e o único que atende a procedimentos de média e alta complexidade na região.

O estudo fundamentou-se na Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 que, sob a perspectiva do indivíduo e das coletividades, incorpora referenciais da bioética, incluindo autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade. Portanto, foi elaborado e apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo II) para garantir a segurança, dignidade e respeito ao participante. Após o esclarecimento de dúvidas e orientações pertinentes, o TCLE foi assinado em duas vias, sendo uma delas retida pelos pesquisadores e a outra pelo sujeito.

Informa-se que o sujeito do estudo foi o paciente J.C.S.S, masculino, 55 anos, metalúrgico, casado, procedente de Feira de Santana - BA, vítima de acidente motociclístico sob condução de uma moto e colisão com um carro, diabético, fratura de tíbia com tratamento com fixador externo, utilizando curativo de Figueiredo, ferida extensa em hemotórax esquerdo envolvendo mamilo esquerdo, católico, sendo admitido na sala vermelha do Hospital Geral Clériston Andrade em 31/08/2024.

Utilizou-se o processo de enfermagem para a condução da coleta de dados, seguindo suas determinadas etapas: 1) Avaliação de enfermagem: Consiste na colhimento de informações essenciais do paciente por meio da anamnese, exame físico, prontuário e considerações da enfermeira-chefe do setor; 2) Diagnóstico de enfermagem: Junção dos problemas vistos na etapa anterior, que servirão como base na intervenção ao cuidado; 3) Planejamento de enfermagem: Intervenções que serão feitas aos problemas levantados anteriormente e resultados esperados para as mesmas; 4) Intervenções e evolução: Realização das ações de cuidado e análise crítica das medidas implementadas ao problema.

Outrossim, utilizou-se para a construção do caso, a análise do prontuário do paciente, das considerações feitas pela enfermeira chefe sobre a sua evolução clínica desde a entrada na clínica ortopédica, bem como pela anamnese e exame físico durante os dias de prática na referida clínica e um instrumento impresso elaborado pelo grupo (Anexo 01) contendo informações necessárias a serem investigadas pelo estudo. Como técnica de levantamento de dados foi implementado um momento de entrevista com o paciente, onde avaliou-se a história clínica contada e, para os diagnósticos de Enfermagem, .

Para auxiliar na aplicação da SAE, foi aplicado a teoria da Conservação de Myra Levine, no qual considera o sujeito paciente como um ser complexo e único, que interage dinamicamente com seu ambiente, tendo respostas individuais às mudanças ambientais e fisiológicas, tornando-se o objetivo do cuidado de enfermagem conservar quatro princípios principais: 1) Conservação da energia do paciente: Em situações de doença, consiste em um desequilíbrio entre a oferta e a demanda metabólica do organismo, e consequentemente, gasto adicional de energia; 2) Conservação da integridade estrutural do paciente: Busca limitar a extensão do dano tissular pela manutenção ou promoção da adaptação do indivíduo às mudanças sofridas; 3) Conservação da integridade pessoal do paciente: Considera a percepção que ele tem acerca de si, das suas crenças, valores e atitudes, bem como à ideia de querer ou não dividir com o outro uma parcela da sua privacidade; 4) Conservação da integridade social do paciente: Mostra que o indivíduo deve ser reconhecido como um ser social em constante interação com a sua família e o meio ao qual pertence. (Moreira *et al*, 2022).

Para a identificação dos diagnósticos de enfermagem, foi aplicado a Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem (NANDA-I), que possibilitou a elaboração de cuidados direcionados à resolução dos problemas apresentados pelo paciente. Com base nisso, desenvolveu-se um plano de cuidados estruturado, com objetivos específicos, voltados para o atendimento das necessidades individuais, considerando seu bem-estar físico e psicológico. Posteriormente, procedeu-se à avaliação da eficácia das intervenções realizadas e à análise dos prognósticos positivos, com a utilização da Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC).

## RESULTADOS

O desenvolvimento do presente estudo tem como base o paciente escolhido devido a complexidade de seu caso dentre os demais no dia da prática em questão. Na coleta de dados, com uso de seu

prontuário, foram utilizados para este estudo, os que entram como interesse para área de enfermagem. Em seus dados de identificação, J.C.S.S., sexo masculino, encontrava-se o leito 34C, possuía idade de 55 anos, branco, casado, católico, metalúrgico, procedente de Feira de Santana - Bahia. Admitido na sala vermelha do Hospital geral Clériston Andrade, trazido pela Via Bahia em decorrência de acidente motociclístico (carro x moto), apresentando fratura da diáfise da tíbia e peirose exposta, ferimento extenso em hemitórax superior esquerdo envolvendo o mamilo esquerdo e lesão em região anterior esquerda.

## LINHA DO TEMPO NA HISTÓRIA CLÍNICA




Figura 01. Linha do Tempo

## EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM

### Dia 01/10 08h

JCSS, 55 anos, sexo masculino, **restrito ao leito**, segue em 30º DIH em Clínica Ortopédica do HGCA devido a acidente de motocicleta. **Refere dor em MIE 8/10**. Antecedentes familiares de hipertensão, diabetes mellitus e doença cardiovascular (mãe), possui diabetes mellitus, em uso contínuo de Glibenclamida e Metformina, nega alergia medicamentosa. Refere cartão vacinal atualizado. Ao exame físico: BEG, LOTE, consciente, responsivo, corado, hidratado, gânglios impalpáveis em região supra e infraclaviculares e axilares; Tórax simétrico e expansivo, MVBD de ápice a base; abdome plano, RHA+. **MIE com curativo de Figueiredo** ocluído com gaze algodoada, atadura e micropore e **fixadores externos secundário a procedimento cirúrgico**; em hemitórax superior esquerdo com cobertura primária de hidrofibra com prata e cobertura secundária com gaze estéril e micropore; **AVP em MSE** infundindo Clindamicina 600mg; **lesão em região anterior do MIE** com cobertura primária de hidrofibra sem prata e cobertura secundária com gaze estéril e micropore. Não refere alterações em

região genital. Eliminações urinárias e fecais regulares. Em dieta oral livre, com boa aceitação. Refere **sono e repouso insatisfatório**, dorme cerca de 1 hora por noite. Em uso de antibióticos, antieméticos, benzodiazepínicos, analgésicos, anti-inflamatórios e antipsicóticos. SSVV: normotenso, normocárdico, normotérmico, eupneico, HGT: 71 mg/dL.

## **QUADRO 1- EXAMES REALIZADOS**

No prontuário não constava exames laboratoriais em anexo. Realizado exames de imagens: Tomografia Computadorizada de Crânio, Tórax, Abdome, Punho (sem alterações); Raio-X de membro inferior esquerdo (fratura de tíbia e peirose esquerda exposta).

## **QUADRO 2 - PROBLEMAS E DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM, SEGUNDO NANDA,NIC, NOC BASEADOS NA TEORIA HOLÍSTICA DE MYRA LEVINE**

| PRINCÍPIOS             | PROBLEMAS                     | D.E                                                                                                                    | META                                           | INTERVENÇÃO                                                                                                                                                                                   | APRAZAMENTO                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservação da energia | Dor aguda                     | Dor aguda relacionada a procedimento cirúrgico evidenciada por autorrelato(escala numérica da dor (08/10)              | Promover o alívio da dor                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar escala numérica da dor;</li> <li>• Administrar analgésico conforme a prescrição;</li> </ul>                                                  | 08:00h;<br>10:00h,12:00h,14:00h,16:00h,18:00h,20:00h,22:00h,00:00h<br>h<br><br>08:00h, 16:00h, 00:00h |
|                        | Distúrbio no padrão de sono   | Distúrbio no padrão de sono relacionado a dor evidenciado por autorrelato verbal e escala numérica de dor (08/10)      | Garantir padrão de sono e repouso satisfatório | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisionar padrão de sono e repouso;</li> <li>• Manter as luzes apagadas no horário de repouso;</li> <li>• Diminuir barulhos externos;</li> </ul> | 13:00h;20:00h                                                                                         |
|                        | Risco de queda                | Risco de queda relacionada a restrição no leito                                                                        | Evitar queda                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter as grades do leito elevada;</li> <li>• Orientar paciente a pedir ajuda,se necessário, e manter os objetos ótimos ao paciente;</li> </ul>      | 08:00h;<br>10:00h,12:00h,14:00h,16:00h,18:00h,20:00h,22:00h,00:00h<br>h                               |
|                        | Mobilidade física prejudicada | Mobilidade física prejudicada relacionada ao uso de fixador externo biplanar em MIE evidenciado por restrição ao leito | Melhorar a mobilidade física                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimular a mobilização dentro dos limites do paciente;</li> </ul>                                                                                   | 08:00h; 14:00h                                                                                        |
|                        | Risco de lesão por pressão    | Risco de lesão por pressão relacionada a restrição ao leito                                                            | Evitar formação de lesão por pressão (LPP)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudança de decúbito a cada 2 horas;</li> <li>• Usar colchão caixa de ovo ou pneumático;</li> </ul>                                                   | 06:00h, 08:00h,<br>10:00h, 12:00h,<br>14:00h, 16:00h,<br>18:00h, 20:00h,<br>22:00h, 00:00h            |
|                        |                               | Risco de infecção no sítio cirúrgico                                                                                   | Evitar que desenvolva                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar técnicas assépticas ao</li> </ul>                                                                                                           |                                                                                                       |

|                                           |                                    |                                                                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Conservação da Integridade de Estrutura I | Risco de infecção                  | relacionada a procedimento invasivo                                                                                            | infecções                                                             | manipular o curativo;<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Monitorar sinais e sintomas relacionados à infecção;</li></ul>                                                                                                     | 06:00h, 08:00h, 10:00h, 12:00h, 14:00h, 16:00h, 18:00h, 20:00h, 22:00h, 00:00h |
|                                           | Integridade da pele prejudicada    | Integridade da pele prejudicada relacionada a procedimento cirúrgico evidenciado por uso de fixador externo                    | Restaurar integridade da pele                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar troca de curativo com técnicas assépticas;</li></ul>                                                                                                                               | 08:00h                                                                         |
| Conservação da Integridade de Pessoal     | Ansiedade                          | Ansiedade relacionada a hospitalização evidenciada por autorrelato verbal                                                      | Reduzir o nível de ansiedade                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tranquilizar o paciente através de diálogo e se possível prover a presença de um acompanhante de forma assídua;</li></ul>                                                                   | 06:00h, 10:00h, 14:00h, 18:00h, 22:00h                                         |
|                                           | Déficit para autocuidado           | Déficit no autocuidado para banho relacionado ao procedimento cirúrgico evidenciado por dificuldade para lavar e secar o corpo | Melhorar a imagem corporal do paciente;                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Realizar assistência no banho;</li><li>• Auxiliar o paciente a se secar e se vestir;</li><li>• Promover mecânica corporal;</li></ul>                                                        | Durante o banho<br><br>08:00h<br><br>06:00h, 18:00h                            |
| Conservação da Integridade                | Processos familiares interrompidos | Processos familiares interrompidos relacionados a hospitalização evidenciado ou autorrelato verbal                             | Retomar processos familiares                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Concitar o entrosamento familiar a fim de melhorar o estado psicoemocional do paciente;</li><li>• Prover mecanismos para que o paciente mantenha a comunicação com os familiares;</li></ul> | 08:00h, 16:00h                                                                 |
|                                           | Desejo de ter alta                 | Disposição para controle da saúde melhorado relacionado ao desejo de ter alta evidenciado por                                  | Promover educação em saúde voltando para o quadro clínico do paciente | <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientar o paciente quanto ao quadro clínico;</li><li>• Identificar as</li></ul>                                                                                                            | 06:00h, 18:00h                                                                 |

|           |  |             |  |                                                            |  |
|-----------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| de Social |  | autorrelato |  | necessidades do paciente para cuidado pós alta hospitalar; |  |
|-----------|--|-------------|--|------------------------------------------------------------|--|

## DISCUSSÃO

A aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em pacientes politraumatizados à luz da Teoria Holística de Myra Levine reflete uma abordagem abrangente e centrada na integralidade do cuidado. Essa perspectiva é particularmente relevante para pacientes que, além de lesões físicas múltiplas, enfrentam impactos emocionais, sociais e psicológicos significativos, exigindo uma intervenção de enfermagem que vá além da dimensão técnica do cuidado (Levine, 1967). A teoria de Levine, ao enfatizar os quatro princípios de conservação – energia, integridade estrutural, integridade pessoal e integridade social – oferece uma estrutura teórica robusta para guiar a prática clínica, especialmente em contextos de alta complexidade, como é o caso do politraumatismo.

## CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

Em pacientes politraumatizados, como no caso estudado, a conservação da energia é um aspecto essencial para o processo de recuperação. O trauma gera uma demanda metabólica elevada, o que coloca o organismo em um estado de catabolismo exacerbado, dificultando a recuperação e aumentando o risco de complicações, como infecções e falência de órgãos. A energia do paciente deve ser preservada para que o corpo tenha os recursos necessários para manter suas funções vitais e promover a cicatrização tecidual (Fagundes, 1983).

Neste cenário, a aplicação do curativo de Figueiredo desempenha um papel fundamental. A técnica protege a área lesionada, reduzindo o risco de infecções e, consequentemente, diminuindo a demanda energética associada à resposta inflamatória. Estudos apontam que o risco de infecção em feridas expostas pode ser reduzido em até 90% com o uso de técnicas de fechamento protetor como a desenvolvida por Figueiredo (Maia, 2023). Ao diminuir a necessidade de intervenções adicionais, como desbridamentos frequentes ou novas cirurgias, a técnica contribui para a economia de energia, permitindo que o organismo foque na recuperação dos sistemas lesados.

Além disso, o manejo adequado da dor é crucial para a conservação da energia. Dor aguda e mal controlada pode ativar respostas neuroendócrinas e aumentar o consumo de oxigênio e glicose pelos tecidos, dificultando a recuperação. A dor é também um fator significativo na interferência no padrão

de sono do paciente, outro ponto crítico para a conservação de energia. A privação de sono pode resultar em desequilíbrio hormonal, aumento do estresse oxidativo e diminuição da função imunológica, fatores que comprometem a recuperação e prolongam o tempo de internação. Nesse contexto, o controle farmacológico da dor com analgésicos como tramadol e medidas não farmacológicas, como a modulação ambiental para promover o sono, são estratégias eficazes para reduzir o gasto energético desnecessário e acelerar o processo de cicatrização (Silva, 2014).

## CONSERVAÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL

A conservação da integridade estrutural é outro princípio fundamental da Teoria de Levine, que se aplica diretamente ao manejo de pacientes politraumatizados. A integridade estrutural refere-se à preservação das estruturas corporais e à promoção de uma cicatrização adequada das lesões, o que, no contexto do politraumatismo, pode ser um grande desafio devido à extensão e gravidade das lesões (Ferreira, 2016). No caso analisado, o paciente sofreu fraturas expostas e lesões extensas em tecidos moles, o que representa um risco elevado de infecções e complicações locais.

O uso do curativo de Figueiredo, nesse sentido, é uma intervenção que contribui significativamente para a conservação da integridade estrutural. A técnica de fechamento com uma prótese de polipropileno protege a ferida de agentes externos, permitindo que o processo cicatricial ocorra sem a interferência de fatores externos, como contaminações ou traumas adicionais. Estudos indicam que essa técnica é particularmente eficaz em feridas de grande extensão e em fraturas expostas, como a tíbia, evitando complicações sérias, como a osteomielite, que poderia comprometer permanentemente a função do membro (Maia, 2023).

Além de promover a cicatrização adequada, a técnica de Figueiredo permite ao paciente manter a mobilidade limitada, o que é crucial para a reabilitação. A manutenção da integridade estrutural do corpo após um politraumatismo requer uma abordagem balanceada entre imobilização suficiente para a cicatrização óssea e tecidual, mas com estímulos progressivos de mobilidade para evitar complicações secundárias, como úlceras de pressão, contraturas articulares e atrofia muscular. A SAE, nesse contexto, é vital para assegurar que o cuidado seja individualizado e que as intervenções respeitem as necessidades e capacidades específicas de cada paciente, prevenindo danos secundários (Zanardo, 2011).

## CONSERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PESSOAL

A conservação da integridade pessoal, segundo Levine, envolve a preservação da dignidade, autonomia e identidade do paciente ao longo do processo de cuidado. Pacientes politraumatizados frequentemente enfrentam não apenas as consequências físicas de suas lesões, mas também impactos emocionais e psicológicos profundos. A hospitalização prolongada, os procedimentos invasivos e a dependência de terceiros para atividades cotidianas podem resultar em um senso de perda de identidade e de controle sobre a própria vida (Levine, 1967).

No estudo de caso, a integridade pessoal do paciente foi ameaçada pela gravidade das lesões e pelo longo período de internação. Entretanto, a equipe guiada pelos princípios de Levine, implementou ações que visavam manter o senso de autonomia e dignidade do paciente. Isso incluiu a promoção do autocuidado, sempre que possível, e a inclusão do paciente no processo de tomada de decisão sobre seu tratamento. Estudos demonstram que pacientes que participam ativamente das decisões sobre seu próprio cuidado apresentam melhores resultados clínicos e uma maior satisfação com a assistência recebida (Fagundes, 1983).

Outro ponto importante para a conservação da integridade pessoal é o suporte emocional. Pacientes como este podem desenvolver distúrbios emocionais, como ansiedade e depressão, devido ao impacto das lesões em sua vida pessoal e social. A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental ao fornecer apoio emocional e psicológico ao paciente, promovendo uma comunicação aberta e compreensiva. Além disso, o envolvimento da família no cuidado é uma estratégia eficaz para preservar o senso de identidade e de pertencimento social do paciente, especialmente em períodos de hospitalização prolongada (Loureiro, 2017).

## CONSERVAÇÃO DA INTEGRIDADE SOCIAL

A hospitalização prolongada, como a que ocorre em pacientes politraumatizados, pode resultar em uma desconexão com o ambiente social e familiar do paciente, afetando sua integridade social. Levine (1967) enfatiza que o ser humano é um ser social, inserido em um contexto de interações com sua família, comunidade e ambiente, e a separação dessas interações pode gerar sentimentos de isolamento e desamparo. Esses sentimentos são exacerbados pela incapacidade física e pela dependência de cuidados, o que pode afetar negativamente o estado emocional e psicológico do paciente, retardando o processo de recuperação.

No caso discutido, o paciente foi afastado de sua rotina social e familiar devido à gravidade de suas lesões e ao longo período de recuperação (Loureiro, 2017). A equipe de enfermagem, seguindo os princípios de Levine, implementou estratégias para promover a integridade social do paciente, incentivando a comunicação com a família e amigos, seja por visitas presenciais ou por meios virtuais, quando necessário. A presença da família durante a hospitalização tem um efeito positivo na recuperação do paciente, proporcionando apoio emocional, reduzindo a ansiedade e melhorando a adesão ao tratamento.

Ademais, a conservação da integridade social implica em reconhecer o paciente como um ser social, com responsabilidades e papéis que extrapolam o ambiente hospitalar. Neste sentido, a SAE deve incluir, em seu plano de cuidados, orientações que auxiliem o paciente a retomar, gradualmente, suas interações sociais e suas atividades cotidianas após a alta hospitalar. O suporte contínuo e o acompanhamento pós-alta são essenciais para garantir que o paciente consiga se reintegrar ao seu ambiente social de forma plena e saudável (Zanardo, 2011).

## CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HOLÍSTICA DE LEVINE NA SAE

A aplicação da Teoria Holística de Myra Levine ao processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem em pacientes politraumatizados contribui para a construção de um cuidado que é, ao mesmo tempo, técnico e humanizado. Ao focar nos quatro princípios de conservação, a enfermagem é capaz de oferecer um cuidado integral, que considera não apenas as lesões físicas do paciente, mas também suas necessidades emocionais, sociais e psicológicas. Esse modelo teórico reflete a complexidade da condição humana, especialmente em contextos de alta complexidade, como o politraumatismo, onde o impacto do trauma afeta múltiplas dimensões da vida do indivíduo (Levine, 1967).

O curativo de Figueiredo, integrado ao cuidado sistematizado de enfermagem, reforça a eficácia de uma abordagem holística. Ao mesmo tempo em que oferece uma solução eficiente para a recuperação física, minimizando o risco de complicações, a técnica permite que o enfermeiro tenha mais tempo e recursos para focar nas outras dimensões do cuidado, como o suporte emocional e a preservação da autonomia do paciente (Maia, 2023). A abordagem proposta por Levine se alinha diretamente com os objetivos da SAE, que visam garantir que o cuidado de enfermagem seja individualizado, contínuo e centrado no paciente (Zanardo, 2011).

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo de caso reafirma a importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), quando associada à teoria holística de Myra Levine, no cuidado a pacientes politraumatizados. A abordagem focada na adaptação do paciente ao ambiente hospitalar e na interação biopsicossocial proporcionou uma recuperação mais rápida e eficaz, com redução de complicações como infecções e do tempo de hospitalização. O uso do curativo de Figueiredo, combinado com a SAE, demonstrou ser uma prática que não só otimiza o tratamento, mas também melhora a qualidade de vida do paciente ao longo de sua recuperação.

A contribuição desta abordagem para a prática clínica é inegável. Ela destaca como o enfermeiro, atuando como gestor do cuidado, pode personalizar as intervenções de acordo com as necessidades individuais do paciente, garantindo que o cuidado seja contínuo e baseado em evidências. Ao aplicar a SAE de forma sistemática, o profissional de enfermagem consegue identificar problemas precocemente, planejar e implementar intervenções específicas e avaliar os resultados, o que promove uma assistência mais eficaz e assertiva.

Além dos benefícios clínicos, essa abordagem holística também traz um impacto significativo no bem-estar do paciente. Ao considerar suas dimensões físicas, emocionais e sociais, o cuidado de enfermagem não se limita à resolução de problemas imediatos de saúde, mas contribui para a restauração da autonomia e para o fortalecimento da identidade pessoal do indivíduo. A humanização do cuidado, ao considerar o paciente como um ser integral e em constante adaptação, é um aspecto crucial para promover não apenas a cura física, mas também o equilíbrio emocional e o suporte social durante o tratamento.

Assim, conclui-se que a combinação entre a teoria de Myra Levine e a SAE não só melhora a prática assistencial, mas também promove um cuidado mais amplo e integrado, resultando em melhores desfechos clínicos e um impacto positivo na vida do paciente e de sua família. Essa abordagem deve ser incorporada de maneira mais ampla na prática diária, contribuindo para uma enfermagem cada vez mais centrada no paciente e na qualidade do cuidado prestado.

Ademais, o presente estudo apresentou como limitação a continuidade do cuidado ao paciente durante a construção do caso clínico, tendo em vista que o cliente em questão recebeu alta da Clínica Ortopédica, setor no qual prestamos os cuidados de acordo com a SAE. Contudo, apesar dessas

delimitações, o processo de enfermagem foi aplicado com êxito, tendo gerado um instrumento de reflexão importante quanto à aplicabilidade da sistematização na assistência e seus resultados.

## REFERÊNCIAS

- BRASIL. Lei 1.498, de 25 de junho de 1986. Brasília: Senado Federal, 1986. [citado 24 out. 2024]. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l7498.htm#:~:text=Art.%201%C2%BA%20%C3%89%20livre%20o,%C3%A1rea%20onde%20ocorre%20o%20exerc%C3%ADcio.](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm#:~:text=Art.%201%C2%BA%20%C3%89%20livre%20o,%C3%A1rea%20onde%20ocorre%20o%20exerc%C3%ADcio.)>
- CARDOSO, M.L.B.N et al. Sistematização da assistência de enfermagem - obstáculos para sua implementação. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 4. n. 3, p. 11149-11156, 2021.
- Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). Mosby, Rio de Janeiro, tradução da 5ª edição, 2010.
- Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: definições e classificação, Artmed, 2018-2020, 11ed.
- FAGUNDES, N .C. O processo de enfermagem em Saúde Comunitária a partir da Teoria de Myra Le-vine. *Rev. Bras. Enf*, 1983. 36: 265-273.
- FERREIRA, J.C.S.C.; MACEDO, S.F. Teoria de Myra Levine aplicada a um paciente com reações hansênicas. *Anais I CONIDIS*. Campina Grande: Realize Editora, 2016. Disponível em: <<https://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/24196>>. Acesso em: 24/10/2024.
- GOMES, N. K. C, et al. Abordagem inicial no paciente politraumatizado. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 6, n. 5, p. 20912-20923, 2023.
- GUERRERO-CASTAÑEDA, RF et al. Characteristics of the phenomenological interview in nursing research. *Revista Gaúcha de Enfermagem*. 2017 July;38(2):e67458. DOI:10.1590/1983-1447.2017.02.67458.
- LOUREIRO, M.C; RODRIGUEZ, J.W; FUJIKI, R.H.M. Avaliação dos impactos socioeconômicos e laborativos em pacientes traumatizados em vias públicas. 34º Congresso da SUMEP, 2017. v. 19.
- MAIA, B.M; CARVALHO, E.C; DAMASCENO, M.A.L; CUNHA, N.M.F; MONTEIRO, W.F. Aplicação da técnica de Figueiredo no cuidado ambulatorial de ferida traumática em um hospital de referência em trauma na região Norte: Relato de experiência. *Revista Multidisciplinar em Saúde*, 2023. v. 4, n. 1.
- MOREIRA, D.A.A, et al. Assistência de enfermagem ao paciente com sepse: análise à luz do modelo conceitual de Myra Levine. *Esc Anna Nery* [Internet]. 2022; 26:20210368. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2021-0368>>.
- NOC- Classificação dos Resultados de Enfermagem. GEN Guanabara Koogan, 5ª edição, 2016.
- PERBONI, J. S; SILVA, R.C; OLIVEIRA, S.G. A humanização do cuidado na emergência na perspectiva de enfermeiros: enfoque no paciente politraumatizado. *Interações*, Campo Grande, MS, v.20, n. 3, p. 959-972, 2019.
- Resolução nº 736 do Conselho Federal de Enfermagem, de 17 de janeiro de 2024 (BR). 2024. [citado 24 out. 2024]. Disponível em: <<https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>>.

SCHOSSLER, D.; LOHMANN, P. M.; PISSAIA, L.F. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL. Revista Destaques Acadêmicos, [S. l.], v. 12, n. 3, 2020. DOI: 10.22410/issn.2176-3070.v12i3a2020.2641.

SILVA, P.O; PORTELLA, V.C. Intervenções de enfermagem na dor. Rev. Dor, 2014. v. 15, n. 2.

ZANARDO, G.M; ZANARDO, G.M. KAEFER, C.T. Sistematização da Assistência de Enfermagem Revista Contexto em Saúde, 2011. v 10, n. 20.

# Capítulo 5



10.37423/241109460

## RISCOS ASSOCIADOS AO USO DE OXANDROLONA POR MULHERES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

*MACIELLE SILVA BARROSO*

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS*

*CRISTIANE VIZIOLI DE CASTRO GHIZONI*

*UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS*



**Resumo:** O uso crescente de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) representa uma preocupação de saúde pública devido aos riscos associados, tanto em doses terapêuticas quanto em doses abusivas, principalmente entre os frequentadores de academias no Brasil. Estes compostos, estruturalmente semelhantes à testosterona, são procurados por indivíduos que buscam mudanças físicas rápidas. No entanto, as compras de forma ilícita associada a falta de supervisão médica aumentam os riscos à saúde. A oxandrolona é utilizada principalmente por mulheres, devido à percepção de menor risco de efeitos colaterais graves, em várias condições médicas e para fins estéticos, mas a sua segurança e possíveis impactos na saúde feminina ainda é preocupante, dada a escassa literatura sobre seus efeitos. Este estudo visou apontar os possíveis riscos e efeitos adversos provenientes do uso da oxandrolona por mulheres para fins estéticos. Este trabalho consiste em uma revisão integrativa e usou pesquisas em bases de dados, tais como PubMed, Scielo e Google Acadêmico. Utilizando critérios de inclusão e exclusão específicos, direcionados para estudos publicados a partir de 2003, foram criteriosamente selecionados 12 artigos que compõem a base desta revisão. Com base nos estudos não há relatos de efeitos colaterais em doses terapêuticas, no entanto, há riscos relacionados à superdosagem no uso de oxandrolona por mulheres. Alguns artigos sugeriram que a oxandrolona seja uma alternativa menos hepatotóxica e não apresenta efeitos adversos, entretanto, a ideia de que essa substância é isenta de efeitos colaterais significativos não é unânime na literatura científica. Alguns autores destacam como efeitos adversos mais comuns associados ao uso prolongado da oxandrolona: o afinamento e a oleosidade capilar, alopecia, engrossamento da voz, crescimento de pelos, surgimento de acnes no rosto e corpo, irritação na bexiga, desregulação do ciclo menstrual, hipertrofia do clitóris, aumento da libido, mudanças no humor e perda de características femininas. Além do mais, com o uso abusivo os efeitos adversos da oxandrolona podem ser abrangentes e evidentes nos sistemas sanguíneo, cardiovascular, sistema nervoso central, músculo-esquelético, gastrointestinal, renal, reprodutivo/endócrino e dermatológico, bem como manifestar-se como efeitos psicológicos e comportamentais. Portanto, a decisão de usar qualquer anabolizante deve ser tomada com extrema cautela e baseada em informações sólidas, com um acompanhamento profissional adequado e um profundo entendimento das possíveis consequências para a saúde.

**Palavras-chave:** Oxandrolona, Esteroides Anabolizantes, Mulheres, Efeitos Adversos, Hormônios.

## 1. INTRODUÇÃO

O aumento significativo no uso de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) é uma preocupação social crescente, devido a sua utilização comum entre atletas não profissionais e frequentadores de academias que buscam mudanças físicas a curto prazo (Do Vale *et al.*, 2021). Ao utilizar um EAA deve-se prestar atenção às propriedades hormonais dessas substâncias, aos efeitos prejudiciais à saúde, além das doses e frequência ministrada. A administração dos EAA leva a alterações orgânicas no corpo decorrentes de seus mecanismos farmacológicos, relacionadas principalmente ao hormônio testosterona (Iriart; Andrade, 2002; Abrahin; De Sousa, 2013; Abreu, 2017).

Os esteroides são lipídios que apresentam um núcleo tetracíclico (núcleo esteroide) em sua estrutura (Marzzocco; Torres, 2018). Os hormônios esteroides naturais são divididos em quatro classes principais: andrógenos, corticóides, estrógenos e progestágenos; sendo a testosterona o principal esteroide androgênico masculino. Os EAA são substâncias sintéticas que compartilham uma semelhança na estrutura química com a testosterona (Barceloux; Palmer, 2013; Barbosa, 2021).

Os EAA são comercializados tanto em formulações injetáveis quanto orais, no entanto, os produtos injetáveis têm um tempo de meia vida mais longa no organismo, devido à sua absorção mais lenta pela via intramuscular. A menor eficácia dos esteroides orais se deve ao processo de metabolismo de primeira passagem no fígado, ficando menos tempo na corrente sanguínea e sendo excretados na urina. Por outro lado, na busca de contornar este problema foi sintetizada por exemplo, a oxandrolona que difere dos outros EAA por ser uma substância modificada para resistir ao metabolismo hepático, o que a torna uma escolha viável para administração por via oral (Souza, 2017; Neto; Aciole, 2018; Marques; Correia, 2019).

A oxandrolona é indicada no tratamento de diversas condições que resultam na perda de massa muscular, tais como: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), perda de peso após cirurgias, desordens neuromusculares, hepatite alcoólica, além dos objetivos estéticos, como auxiliar na redução de gordura corporal e aumento da massa muscular. É também recomendada no tratamento agudo de pacientes queimados, contribuindo para a redução do período de internação e a melhoria de diversos indicadores relacionados ao crescimento muscular e à cicatrização de feridas (Gonzaga, 2016; Li, *et al.*, 2016; Bernardina, 2019; Ring, *et al.*, 2020).

Conforme estudo realizado por Marques e Correia (2019), a oxandrolona é especialmente vendida para uso em indivíduos do sexo feminino. Provavelmente, isso se deve ao fato de a oxandrolona ser

associada a uma incidência menor de efeitos colaterais. No entanto, a segurança e os possíveis riscos associados à sua administração ainda são uma questão de preocupação à saúde principalmente por seus usos através de indicações não médicas.

Cabe ressaltar que os esteroides anabolizantes são medicamentos e para utilizá-los precisa de prescrição médica com o CID (Código Internacional de Doenças) e a indicação da finalidade terapêutica. A prescrição deve ser feita em doses fisiológicas, que equivalem a doses produzidas pelo corpo humano. Além disso, a oxandrolona é comercializada de forma legalizada exclusivamente em farmácias de manipulação. Dessa forma, prescrever e comercializar essas substâncias sem que haja um motivo apropriado desrespeita as determinações da Anvisa e do Ministério da Saúde, sendo considerada nesses casos de atos ilícitos com possíveis consequências nas esferas penal, civil e administrativa aos profissionais que o fazem (Cisneiros *et al.*, 2021).


Considerando a crescente popularidade do uso de EAA como a oxandrolona entre as mulheres, foi levantado a seguinte questão: “Quais riscos e possíveis efeitos colaterais que a oxandrolona pode causar em mulheres?”. Para responder a essa pergunta, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos causados pela oxandrolona, tanto os benéficos quanto os prejudiciais, e investigar os possíveis impactos na saúde feminina.

## 2. REFERENCIAL TEÓRICO

### 2.1. CONCEITOS SOBRE O HORMÔNIO TESTOSTERONA E ESTEROIDES ANABOLIZANTES

Os hormônios são substâncias químicas, produzidas por células endócrinas, que após secretadas vão agir em órgãos-alvo, desempenham funções fisiológicas como aumentar ou diminuir a atividade celular, estimular a multiplicação celular e induzir a diferenciação celular. Quimicamente, os hormônios podem ser aminas (derivados de aminoácidos), peptídeos ou proteínas e esteroides (Rocha; Aguiar; Ramos, 2014). As moléculas esteroides endógenas são sintetizadas a partir da combinação de moléculas de acetil-CoA, formando uma estrutura isoprenóide, que se combinam para formar o núcleo esteroide (ciclopentanoperidrofenantreno) dando origem, após várias reações, ao colesterol e seus derivados. A partir do colesterol, como mostra na figura 1, são sintetizados os hormônios adrenocorticais (aldosterona e cortisol) e os hormônios sexuais (estrogênio, progesterona e testosterona) (Rocha; Aguiar; Ramos, 2014; Marzzocco; Torres, 2018).

**Figura 1** - Síntese dos hormônios esteroides.



Fonte: AUTOR.

Os hormônios sexuais masculinos (esteroides androgênicos) são divididos em quatro formas diferentes que circulam no corpo: testosterona, androstenediona, diidrotestosterona (DHT) e deidroepiandrosterona (DHEA) ou seu derivado sulfatado (DHEAS) (Cisneiros *et al.*, 2021). A testosterona (Figura 2) é um hormônio produzido nos homens nos testículos e glândulas adrenais, enquanto nas mulheres, nos ovários e córtex adrenal (Souza *et al.*, 2022). Por se tratar de um hormônio lipofílico, a testosterona é encontrada livre em pequena quantidade no sangue, sendo transportada principalmente pela albumina e globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) (Cisneiros *et al.*, 2021).

**Figura 2** - Fórmula estrutural da molécula de testosterona.



Fonte: Patané *et al.*, 2020.

A primeira sugestão de que a testosterona poderia ser usada para restaurar a "vitalidade" remonta a 1889, quando Brown-Séquard relatou um retardo no processo de envelhecimento após a autoadministração de um extrato testicular. Essa descoberta estimulou pesquisas intensivas sobre os potenciais efeitos antienvelhecimento da testosterona, mesmo antes de seu isolamento estrutural. A testosterona foi sintetizada pela primeira vez em 1935, tornando os andrógenos disponíveis para uso terapêutico e pesquisa. Inicialmente, houve pouco interesse dos pesquisadores em entender os efeitos dessas substâncias no desenvolvimento, manutenção e recuperação da força muscular, no entanto, isto mudou com o passar dos anos, e passou a ser foco de diversas pesquisas (Cunha *et al.*, 2004).

Na década de 40 durante a segunda guerra mundial, a testosterona foi intensamente utilizada para a recuperação de massa muscular dos soldados e balanço de nitrogênio em vítimas desnutridas submetidas ao jejum forçado. Há relatos de que as tropas alemãs também usaram essas substâncias para aumentar a agressividade de seus soldados durante a guerra (Cunha *et al.*, 2004; Marques, 2015).

A importância terapêutica da testosterona levou a produção de derivados sintéticos como os esteroides anabolizantes androgênicos (EAA). A finalidade de se buscar compostos sintéticos foi para encontrar produtos que pudessem maximizar os efeitos de construção muscular e minimizar os efeitos secundários da testosterona, ou seja, aumentar sua atividade anabólica e diminuir a atividade androgênica. Os efeitos androgênicos estão relacionados à função reprodutiva e características sexuais secundárias, enquanto os efeitos anabólicos promovem o crescimento e a maturação de tecidos não reprodutivos (Marques, 2015; Bernardina, 2019; Gontijo *et al.*, 2023). Dessa forma, os anabolizantes androgênicos são derivados sintéticos desenvolvidos a partir da testosterona, caracterizados por seu forte efeito anabólico e uma atividade androgênica relativamente reduzida quando comparados à testosterona (Mantovani; Madeddu; Macciò, 2013).

Os EAA apresentam efeitos androgênicos e anabólicos distintos, sendo os efeitos androgênicos relacionados às características sexuais masculinas como: crescimento do pênis, aumento da próstata e modificações capilares, que podem incluir crescimento em várias regiões do corpo ou, em alguns casos, calvície. Na mulher manifestam através de características como: engrossamento de voz, crescimento de pelos no corpo no padrão de distribuição masculino, irregularidade menstrual e aumento do clitóris (Ferreira, 2014; Cunha, *et al.*, 2004). Por outro lado, os efeitos anabólicos são os que os usuários geralmente buscam, pois esses esteroides estimulam o crescimento muscular. Assim, seu uso aumenta a força contrátil das células musculares por meio do armazenamento de


fosfocreatina, com maior retenção de nitrogênio nos músculos, melhorando a captação de aminoácidos e inibindo a ação do cortisol (um hormônio catabólico). Além disso, eles aumentam a concentração de hemoglobina e hematócrito, reforçam a reposição de cálcio nos ossos e reduzem as reservas de gordura corporal (Ferreira, 2014; Souza *et al.*, 2022).

O desenvolvimento de EAA foi destinado inicialmente ao tratamento de condições como sarcopenia, hipogonadismo, câncer de mama, osteoporose e outras doenças que envolvem redução de massa muscular. No entanto, foi observado um possível uso no campo esportivo e estético, onde passaram a ser empregados para aumentar a força e a massa muscular, porém os efeitos adversos dos EAA nesse contexto são motivos de controvérsia entre os profissionais da área da saúde (Marques, 2015; Machado; Ribeiro; Soares, 2015).


Os EAA são comercializados para administração por via oral ou intramuscular. No entanto, também são relatados casos de administração de formas alternativas dessas substâncias, não recomendadas legalmente, envolvendo o uso por via retal, nasal e transdérmica, bem como, o implante de cápsulas com o objetivo de evitar o metabolismo de primeira passagem no fígado (Lise *et al.*, 1999; Lima; Cardoso, 2011).

Existem dois tipos de esteroides anabolizantes: 17  $\alpha$ -alquila e 17  $\beta$ -esterificada (Rezende; Muniz., 2020). Na figura 3 podemos observar exemplos de esteroides anabolizantes 17  $\alpha$ -alquilados como oxandrolona, oximetolona e fluoximesterona. Enquanto, na figura 4 observamos o cipionato de testosterona, enantato de testosterona, propionato de testosterona, decanoato de nandrolona e fenpropionato de nandrolona que são exemplos de esteroides anabolizantes 17  $\beta$ -esterificados (Lise *et al.*, 1999).


**Figura 3** - Estruturas químicas de esteroides anabolizantes 17  $\alpha$ -alquilados.



Oxandrolona




Oximetolona




Fluoximesterona


Fonte: Adaptado (Coimbra, 2021).




Cipionato de testosterona




Enantato de testosterona



Propionato de testosterona



Decanoato de nandrolona



Fenpropionato de nandrolona

Fonte: Adaptado (Coimbra, 2021).

## 2.2. MECANISMO DE AÇÃO DOS ESTEROIDES ANABOLIZANTES ANDROGÊNICOS (EAA)

Conforme foi descrito por Lima e Cardoso (2011) o mecanismo de ação da testosterona:


(...) enzima 5 $\alpha$ -redutase catalisa irreversivelmente a conversão da testosterona em DHT. Tanto a testosterona quanto a DHT agem através do mesmo receptor, o receptor de androgênio, porém o receptor tem maior afinidade pela DHT que ativa a expressão gênica mais eficientemente.

Quando o complexo enzimático aromatase está presente no tecido, predominantemente no tecido adiposo e fígado, ocorre a conversão da testosterona em estradiol. Essa conversão resulta em aproximadamente 85% do estradiol circulante em homens. Outros compostos biologicamente inativos, como a androsterona e eticolanona, são formados pela metabolização hepática e pela metabolização da DHT.

Algumas evidências sugerem a existência de transportadores e/ou receptores de membrana para a testosterona. Após entrar na célula, o hormônio será convertido a DHT ou agirá diretamente, ligando-se ao receptor de androgênio, que pertence à super-família de receptores nucleares. Tanto a testosterona quanto a DHT ligam-se ao domínio de ligação ao hormônio do receptor, permitindo a ligação do complexo a genes responsivos, agindo como um fator transcricional que regula a expressão desses genes.

Ainda se tem algumas dúvidas sobre o exato mecanismo de ação dos EAA, no entanto de forma geral, o mais aceito está ilustrado na figura 5. O esteroide anabólico exógeno entra e é transportado através do citoplasma na célula do tecido alvo. Na sequência, pode ser reduzido pela enzima citoplasmática 5 $\alpha$ -redutase, e tanto a forma exógena quanto seu produto reduzido podem se ligar ao receptor andrógeno. Após, forma-se um complexo que sofre uma alteração estrutural, o que permite ao complexo receptor-ligante se deslocar para o núcleo celular, onde se liga diretamente a sequências de nucleotídeos específicas no DNA cromossômico. Essa ligação direta do complexo receptor-ligante às sequências nucleotídicas do DNA aumenta a biossíntese fisiológica de testosterona. Essas áreas de ligação são chamadas ERHs (elementos de resposta hormonal), têm um impacto na atividade transcricional de genes específicos, resultando na manifestação dos efeitos androgênicos (Albano *et al.*, 2021).

**Figura 5** - Mecanismo geral dos esteroides anabolizantes exógenos.



DHN - Hormônio esteroide anabólico exógeno ou sua forma reduzida; HSP - Proteínas de choque térmico; AR - Receptor de andrógeno; STAR - Ativador de testosterona; CYP - Mono-oxigenases do citocromo P450; HSD - Enzima 17 $\beta$ -hidroxiesteróide desidrogenase; sER - receptor esteroide.

Fonte: Albano *et al.*, 2021.

Albano *et al.* (2021) em seu estudo indicou que os EAA têm influência no estresse oxidativo. Eles podem desempenhar danos no DNA, afetar o funcionamento da cadeia respiratória mitocondrial e dos sistemas mono-oxigenase, levando a um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e sua eliminação. Embora a atividade física tenha um efeito benéfico na redução do estresse oxidativo devido ao aumento das enzimas antioxidantes, os EAA parecem comprometer a proteção do coração contra lesões isquêmicas mediadas pelo estresse oxidativo. Além disso, estudos em humanos demonstraram que a administração suprafisiológica de testosterona prejudica a função endotelial devido à disfunção da capacidade antioxidante. O estresse oxidativo também desempenha um papel na neurotoxicidade associada aos EAA, e seu impacto pode variar dependendo dos níveis de estresse oxidativo, com andrógenos podendo ser neuroprotetores em níveis baixos, mas prejudiciais em níveis elevados.

### 2.3. ANABOLIZANTES E SEUS USOS PARA FINS ESTÉTICOS E ESPORTIVOS

Os esteroides são frequentemente prescritos para pacientes com doenças graves que causam perda de massa muscular. Como exemplo, indivíduos que enfrentam condições como AIDS e usam EAA podem obter efeitos benéficos significativos devido ao aumento da massa muscular magra e ao impacto positivo no sistema imunológico do corpo. Esses benefícios tornam os esteroides anabolizantes atraentes para frequentadores de academias e praticantes de atividades físicas que desejam atingir seus objetivos estéticos ou esportivos de forma mais rápida (Kraska; Bussard; Brent, 2010).

Os esteroides anabolizantes são conhecidos por aumentar a síntese de proteínas nos músculos esqueléticos, sendo este um processo anabólico que ajuda a reverter os processos catabólicos. Devido a essas propriedades, alguns atletas (não profissionais) recorrem ao uso dessas substâncias na tentativa de melhorar seu desempenho atlético, ganhando vantagem em termos de força e massa muscular (Araujo, 2020).

De acordo com Steinmann, Körner e Gramel (2021) em uma pesquisa com estudantes de esportes na Alemanha, foi observado que o uso dos EAA está associado a busca por uma aparência física ideal (motivação recorrente), agravada pela pressão subjetivamente percebida para alcançar um desempenho físico superior, tanto dentro como fora do contexto esportivo. Kicman (2008) observou em um estudo (também na Alemanha) que os anabolizantes tinham efeitos permanentes em

mulheres, onde o aumento de força e desempenho não retornava aos valores pré-tratamento após a interrupção do uso da substância.

A utilização de compostos para melhorar o desempenho de atletas ocorre há anos, no entanto, o primeiro caso divulgado foi em 1954, em um campeonato de levantamento de peso. O Brasil passou a considerar o uso dos EAA por atletas profissionais como doping na década de 80 (Cisneiros *et. al.*, 2021). Dessa forma, os órgãos reguladores do esporte como as agências antidoping implementaram rigorosos programas de testes antidoping para detectar o uso de esteroides, sendo assim, os EAA fazem parte das substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico brasileiro (Agência Mundial Antidopagem, 2021). Substâncias, métodos e outras tecnologias são permitidas pela ética do esporte desde que sejam complementares ao corpo atlético. É aceitável, por exemplo, treinar em altitudes maiores para melhorar o condicionamento físico, entretanto, é proibido o uso de um método no qual o corpo seja penetrado por uma seringa para retirar células de sangue que serão, posteriormente, reinjetadas. Em ambos os exemplos, a capacidade de transporte de oxigênio e resistência muscular são melhorados, mas apenas esse último método é proibido (Silveira, 2013).

Pode-se argumentar que o uso de EAA está vinculado a metas estéticas, considerando que a insatisfação com a imagem corporal leva, sobretudo as mulheres, a buscar meios para atingir um ideal de corpo magro e definido (Kotzé; Antonopoulos, 2021). Vale ressaltar nesse contexto, que o uso de EAA através de prescrições ilegais é muito comum como afirma o estudo realizado por Dias (2016), as prescrições dos anabolizantes para fins estéticos no Brasil nem sempre é feita por profissionais médicos, existindo o uso por indicação de outros profissionais de saúde ou de educadores físicos, desrespeitando a legislação de controle (lista C5 da Portaria 344/1998 e suas atualizações, Resolução RDC 357/2020 da Anvisa e Lei 9965/2000, Resolução CFM 2333/2023).

## 2.4 . EFEITOS ADVERSOS ADVINDOS DO USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES

Os efeitos adversos dos EAA estão principalmente associados às suas propriedades androgênicas e à sua toxicidade. Esses efeitos podem impactar diversos órgãos e sistemas do corpo e podem ser agravados por fatores como o tipo de EAA utilizado, a dosagem, a idade do usuário, o sexo, a predisposição genética e o uso prolongado (Abrahin; De Sousa, 2013).

Homens que fazem uso de esteroides anabolizantes podem experimentar efeitos colaterais como ginecomastia, acne, variações na libido, retenção de líquidos, aumento da agressividade e até mesmo disfunção erétil. Enquanto isso, mulheres que utilizam essas substâncias podem enfrentar problemas


como irregularidades menstruais com a diminuição dos níveis de hormônios luteinizantes e folículo estimulante, características masculinizantes, hipertrofia do clitóris, espessamento da voz, crescimento de pelos no corpo, redução do tamanho das mamas e acne (Fest, 2018).

Inúmeros efeitos adversos podem ser causados pelo uso indiscriminado de EAA podendo afetar vários órgãos e sistemas do corpo. A automedicação com dosagens abusivas pode levar a dislipidemias com aumento do colesterol total, diminuição de HDL (lipoproteína de alta densidade), aumento de LDL (lipoproteína de baixa densidade) e aumento de triglicérides (Tuma *et al.*, 2015). Podem gerar complicações cardiovasculares como lesões cardíacas, hipertrofia cardíaca, cardiomiopatias, aterosclerose, aumento do risco de hipertensão, infarto agudo do miocárdio, arritmias e morte súbita (Do Carmo, 2009; Torrisi *et al.*, 2020). Outros efeitos indesejados são: comprometimento do sistema nervoso central, alterações cognitivas e comportamentais, redução na densidade de neurônios da base e no hipocampo, insuficiência cardíaca e renal, hepatotoxicidade, alterações endócrinas e efeitos masculinizantes em mulheres. Além de acne, calvície e aumento do risco de lesões musculares e articulares devido ao supertreinamento (Brahin *et al.*, 2013; Pereira *et al.*, 2023).

## 2.5. ESTRUTURA, EFICÁCIA E METABOLISMO DA OXANDROLONA

A oxandrolona é um esteroide anabolizante que é conhecido pelos nomes comerciais Anavar® ou Oxandrin®, com fórmula molecular  $C_{19}H_{30}O_3$ , fórmula química 17 $\beta$ -Hydroxy-17 $\alpha$ -methyl-2-oxa-5 $\alpha$ -androstane-3-one e estrutura química conforme figura 6. Este medicamento é frequentemente administrado na forma de comprimidos orais, as doses diárias indicadas para ganho de massa com oxandrolona variam entre 2,5mg a 20mg, sendo a dose usual mais comum 5mg a 10mg diários em várias tomadas durante 2 a 4 semanas (Drugs.com, 2023).

**Figura 6** - Estrutura Química da Oxandrolona



**Oxandrolona**

Fonte: [www.stabilis.org](http://www.stabilis.org).

De acordo com a RDC nº 372, de 15 de abril de 2020:

(...) a oxandrolona é classificada como um anabolizante sujeito à Receita de Controle Especial em duas vias na lista C5. Essa medida visa aprimorar o controle e a supervisão sobre o uso da oxandrolona devido aos potenciais riscos à saúde e ao seu histórico de abuso.

Esse esteroide anabolizante tem sido usado com eficácia há muitos anos para o tratamento de distúrbios de crescimento, como a síndrome de Turner, perda de peso após cirurgia, atraso constitucional de crescimento e infecções crônicas relacionados, por exemplo, a perda de peso associado ao HIV. O mecanismo pelo qual promove o crescimento é em grande parte desconhecido (Papadimitriou *et al.*, 2001).

A oxandrolona é uma droga ideal para a administração por via oral pois são modificadas para aumentar sua resistência ao metabolismo hepático. Por ser classificada como 17  $\alpha$ -derivados devido à adição de um grupo alquila à posição 17 $\alpha$  da testosterona, o que retarda o seu catabolismo hepático, proporciona melhor afinidade ao receptor e dificuldade de ser convertido em estradiol (Marques; Correia, 2019). Ronchi (2022) sugeriu que a alquilação no carbono C17 presente na molécula da oxandrolona confere essa capacidade de absorção oral e redução dos efeitos deletérios no fígado pela alta metabolização na primeira passagem. Devido a baixa taxa de biotransformação hepática, cerca de 28% da oxandrolona é excretada na forma inalterada na urina.

A oxandrolona possui uma notável atividade anabólica e baixa atividade androgênica, o que resulta em uma excelente relação entre atividade anabólica e androgênica (Orr; Singh, 2004). No estudo de Souza *et al.*, (2022), os autores afirmaram que a moderada ação andrógena causa efeitos adversos menos pronunciados, no entanto, este efeito tem uma íntima ligação com a quantidade utilizada.

### 3. OBJETIVO

#### OBJETIVO GERAL

Apontar os riscos e efeitos adversos provenientes do uso da oxandrolona por mulheres para fins estéticos.

#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conduzir uma revisão integrativa abrangente nas principais bases de dados eletrônicas de estudos científicos;
- Investigar a utilização da oxandrolona por mulheres;

- Analisar criticamente os principais estudos para consolidar as evidências disponíveis na literatura acadêmica;
- Analisar a ação da oxandrolona no organismo feminino;
- Identificar os efeitos adversos associados à administração da oxandrolona em mulheres.

## 4. METODOLOGIA

O presente estudo adotou a metodologia de pesquisa por meio de revisão integrativa, na qual inicialmente se faz as perguntas norteadoras que farão parte dos objetivos. Dessa forma, a abordagem metodológica busca aprofundar o entendimento sobre o uso da substância oxandrolona relacionada à prática de exercícios físicos, com foco nos efeitos adversos e possíveis riscos para as mulheres.

Foram selecionados os estudos mais pertinentes acerca do tema, obedecendo alguns critérios de elegibilidade, como: artigos no idioma português e inglês; estudos publicados nos últimos 20 anos; e estudos que discutam os efeitos adversos causados pela oxandrolona nas mulheres. Os critérios de exclusão utilizados foram: ausência de informações sobre os efeitos adversos da oxandrolona.


Foram selecionados os bancos de dados PUBMED, Google Acadêmico, Scielo e Science Direct como fontes para a pesquisa. Esses bancos de dados são conhecidos por conterem uma ampla variedade de artigos acadêmicos e científicos em diversas áreas. As buscas foram conduzidas utilizando os seguintes termos em português: "anabolizantes", "esteroides anabólicos", "oxandrolona", "utilização da oxandrolona por mulheres" e "efeito colateral da oxandrolona". Em inglês: "Anabolic steroids", "anabolic steroids", "oxandrolone", "use of oxandrolone by women" and "oxandrolone side effects".

A pesquisa foi conduzida semelhante a conformidade com as diretrizes do PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), uma estrutura desenvolvida para auxiliar os autores na elaboração de revisões sistemáticas e meta-análises (Moher *et al.*, 2015). No entanto, foi realizada uma adaptação dessas diretrizes para atender às particularidades do presente estudo, pois se trata de uma revisão integrativa. A figura 7 apresenta a aplicação das quatro fases recomendadas pelo PRISMA utilizadas neste trabalho.

Foram selecionados 31 estudos, após leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 13 estudos (1 estudo duplicado, 9 não contemplavam o tema e 3 foram publicados há mais de 20 anos). Dentre os 18 estudos, após ser feito uma leitura na íntegra foram excluídos 6 estudos (2 não possuíam acesso

ao texto completo, 4 não contemplavam a temática). Finalmente, utilizando os critérios de inclusão e exclusão nos artigos, resultou em um número final de 12 artigos incluídos.

**Figura 7** - Fluxograma do levantamento de dados.



Fonte: AUTOR.

## 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

### 5.1. TRABALHOS SELECIONADOS

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, se obteve um levantamento de 12 estudos relevantes para o tema. Os dados foram colocados na tabela 1, divididos em: base de dados, autores, periódicos, objetivo de estudo e conclusão/considerações finais. Dos estudos selecionados, 2 são trabalhos de conclusão de curso, 2 monografias de especialização, 1 tese de doutorado e 7 artigos científicos. Quanto ao local dos trabalhos, 9 são brasileiros e 3 estrangeiros. Sobre o tipo de trabalho 8 são revisões, 1 estudo de caso e 2 pesquisas com animais.

Com intuito de escolher o tema da pesquisa foi feita uma busca no início para se ter certeza de que seria um trabalho inédito, e como não foi encontrado nada semelhante nas plataformas, o tema foi decidido. No entanto, ao se começar a pesquisa, houve significativas dificuldades na etapa de levantamento bibliográfico devido à notável escassez de obras disponíveis, especialmente aquelas que tratam da relação entre mulheres, esteroides anabolizantes, oxandrolona e os riscos associados. Isso evidencia a necessidade de haver mais estudos relacionados ao conhecimento nessa área.

**Tabela 1** - Estudos selecionados.

| Nº | Base de Dados    | Título do Artigo                                                                                                                                                                                     | Autores                                         | Periódico e dados do artigo                                    | Objetivo do Estudo                                                                                                                                                                                                                                                 | Conclusão/Considerações finais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pub Med          | O esteroide anabólico androgênico oxandrolona no tratamento de distúrbios catabólicos e emagrecedoras: revisão da eficácia e segurança.                                                              | Orr, R.; Singh, M. F.                           | Drogas, v. 7, n. 64, p. 725-50, 2004.                          | Analisar as relações entre risco e benefício para a oxandrolona e outros agentes na sua classe para aceitação clínica generalizada dos EAA como uma opção terapêutica na sarcopenia e outras condições de emancipação crônica.                                     | A oxandrolona se destaca entre outros esteroides anabolizantes devido à sua administração oral, alta potência anabólica em comparação com a androgênica e à falta de evidências de toxicidade hepática grave ou irreversível. No entanto, a preocupação recai sobre o uso prolongado de oxandrolona, especialmente em indivíduos com fatores de risco cardiovascular ou doença hepática. |
| 2  | Google Acadêmico | Problemas relacionados ao uso de Esteroides Anabólicos Androgênicos (EAA) por praticantes de musculação e o papel do farmacêutico na educação destes atletas de modo a reduzir o uso indiscriminado. | De Souza, A.; Do Nascimento, A. M.; Cole, E. R. | Infarma-Ciências Farmacêuticas, v. 25, n. 3, p. 143-154, 2013. | Abordar a crescente preocupação com a busca obsessiva pelo corpo perfeito, que tem levado muitas pessoas a recorrerem a métodos extremos, como o uso de esteroides anabolizantes e determinar o papel do farmacêutico é destacado como fundamental nesse contexto. | Os esteroides anabólicos androgênicos (EAA) são fármacos altamente eficazes em sua proposta de desenvolvimento muscular, mas potencialmente perigosos. O farmacêutico, assume papel fundamental na educação de usuários de EAA, esclarecendo-os sobre os riscos inerentes a tal prática, atuando de forma decisiva no desencorajamento do uso.                                           |

|   |                  |                                                                                                               |                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Google Acadêmico | Mulheres, ampolas e músculos: o uso de esteroides anabolizantes em academias de ginástica.                    | Naves, B. D. S.   | Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013.                            | O objetivo desta monografia, a partir de uma etnografia em uma academia de Brasília, foi conhecer e analisar os processos pelos quais as mulheres se submetem na busca pela otimização da aparência física.                                                                                                     | Os dados obtidos demonstram que a estética é o principal motivador para o consumo de anabolizantes e suplementos alimentares. As mulheres, insatisfeitas com seus corpos, buscam as academias de ginástica e, especificamente a musculação, para modificarem seus corpos e sanarem suas imperfeições. Assim, um corpo magro, definido e hipertrofiado satisfaz essas mulheres, sendo motivo de orgulho para elas. |
| 4 | Google Acadêmico | Uso de esteroides anabólicos andrógenos em praticantes de musculação no Brasil: revisão de literatura médica. | Dias, J. G. G. J. | Monografia (Graduação em Medicina) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 2016. | Levantar os estudos feitos no Brasil quanto ao uso de esteroides anabólicos andrógenos em praticantes de atividades física, em especial a musculação, verificando os aspectos demográficos e culturais associados a esse uso, bem como as alterações patológicas mais frequentemente encontradas em associação. | O consumo de esteroides anabolizantes no Brasil é prática frequente. Os consumidores brasileiros dessas drogas, mesmo conhecendo seus efeitos colaterais, não restringem seu uso. Foram relatados casos de insônia, hepatotoxicidade, problemas de tendões e ligamentos em usuários contínuos de esteroides andrógenos, além de, efeitos colaterais.                                                              |

|   |                  |                                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Google Acadêmico | Esteroides anabólicos androgênicos: uma revisão cronológica.                                                                          | Abreu, J. F.                      | Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017. | Alcançar todas as classes populacionais, proporcionando-as conhecimento acerca dos esteroides anabólicos androgênicos, a partir de uma análise ampla proporcionada pelo histórico cronológico e descritivo sobre essas drogas, para alertá-las quanto às adversidades ocasionadas devido sua ministração, através de campanhas. | O conteúdo reunido, deve possibilitar a disseminação do tema esteroides anabólicos androgênicos, bem como de sua influência sobre a sociedade. De um modo geral, a pesquisa demonstrou resultado satisfatório e denota numerosas informações pertinentes para conceituar, listar, historiar, atribuir desígnios e descrever tais drogas sintéticas auxiliando no desenvolvimento do estudo, pois constroem um relato histórico cronológico e descritivo.                                                  |
| 6 | Google acadêmico | Determinação do perfil de prescrição de oxandrolona e estanozolol em farmácias de manipulação de Vitória Da Conquista no ano de 2019. | Marques, M. S.; Correia, P. A. C. | Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 6, p. 34696-34706, 2019.                                                                                         | Intuito de fazer um estudo a respeito do uso de esteroides anabolizantes em farmácias de manipulação, e determinar o seu perfil de uso, a forma farmacêutica e a dosagem, identificar os motivos que levam ao uso dos esteroides, e identificar a especialização do prescritor e relacionar ao seu uso.                         | A informação e o aconselhamento sobre o uso de EAA deve ser difundida, sendo interessante realizar estratégias a respeito destas drogas para a população, e no caso da rede de farmácias de manipulação, os próprios farmacêuticos podem tomar o papel de informar os pacientes ao realizar a atenção farmacêutica adequada, pois a partir dessa abordagem em pesquisa pode-se obter esclarecimento em relação ao uso destas substâncias, proporcionando melhor orientação ao paciente pelo farmacêutico. |

|   |                  |                                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Google Acadêmico | Levantamento sobre os efeitos positivos e negativos relacionados ao uso de esteroides anabólicos. Revisão de literatura.                  | Corulli, M. J. S.   | Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Educação Física) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Rio Claro, 2020. | A presente revisão teve o objetivo de coletar informações sobre os efeitos colaterais causados pelos esteroides anabolizantes, seu padrão de uso entre as faixas etárias, os motivos, além de outras informações sobre este tema.                                                                                                           | O uso destas substâncias não deve ser, em hipótese alguma, realizado sem o acompanhamento de profissionais especializados; deve-se saber quais destas drogas são permitidas antes de decidir pelo uso, e também procurar saber sobre quais são os efeitos colaterais que a droga pode ou não causar, assim como suas dosagens corretas.                                                                                                                                                          |
| 8 | Google Acadêmico | Efeitos prejudiciais provocados pela utilização de anabolizantes esteroides androgênicos (EAA) em mulheres praticantes de fisiculturismo. | Barbosa O. de J. P. | São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021.                                                                                                | O objetivo geral da pesquisa é descrever, caracterizar e investigar os principais hormônios afetados pelo uso de EAA dentre eles a nandrolona e a oxandrolona no organismo de mulheres que utilizam a droga, identificar as alterações fisiológicas e os efeitos colaterais a curto e longo prazo, como é prejudicial à saúde dos usuários. | Após analisar os dados, conclui-se que vários são os malefícios no corpo pelo abuso de EAA e os seus derivados, alguns sendo irreversíveis pelo tempo de administração e outros sendo reversíveis após a suspensão da droga. Aos usuários de anabolizantes, por conta das mudanças no corpo, é notório saber quem faz uso das drogas. Os sistemas afetados com o uso dos EAA são: sistema nervoso central, sistema cardiovascular, hepático, renais, musculoesquelético, reprodutivo, sanguíneo. |

|    |                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Science Direct   | O tratamento com oxandrolona em ratos juvenis induziu comportamento semelhante à ansiedade em animais adultos jovens. Cartas de Neurociência, 2021 | Bernardina, N. R. D.; De Lima, R. M. S.; Ronchi, S. N.; Mass, E. M. W. D.; Souza, J. S.; Rodrigues, L. C.; Bissoli, N. S.; Brasil, G. A. | Cartas de Neurociência, 2021.                                          | Avaliar o comportamento ansioso induzido em ratos adultos jovens após o tratamento de animais juvenis com oxandrolona (OXA).                                                                                                                                     | O tratamento de ratos jovens com OXA levou a um comportamento semelhante ao da ansiedade em animais adultos jovens, independentemente da dose utilizada, com pequenas alterações na maquinaria antioxidante localizada no hipocampo.                                                                                                                                                         |
| 10 | Google Acadêmico | Musculação e o uso de esteroides anabolizantes.                                                                                                    | Costa, A. C. C.; Lima, E. M.; Santos, J. S.                                                                                              | Research, Society and Development, v. 10, n. 13v. e581101321462, 2021. | Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que usa como ponto de partida a idealização do corpo perfeito, propagado pelas mídias sociais e buscado por praticantes de musculação, que utilizam os anabolizantes como forma mais rápida de obter o objetivo desejado. | De um modo geral, os esteroides anabolizantes são utilizados para fins terapêuticos e sob acompanhamento médico, mas a grande preocupação está no uso em excesso, com finalidade diversa e sem prescrição profissional para uso. Isso porque, os efeitos adversos causam grandes problemas aos usuários, sobretudo podendo em sua maioria desencadear problemas crônicos e/ou irreversíveis. |

|    |                  |                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Google Acadêmico | Impacto do Tratamento com Oxandrolona nas Funções Cardíaca e Renal de Animais Jovens.            | Ronchi, S. N.                                               | Tese (Doutorado em Ciências Fisiológicas) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Espírito Santo, 2022. | Esse trabalho tem por objetivo analisar a influência do tratamento com OXA sobre a função contrátil cardíaca, tônus autonômico e função renal de ratos jovens. | Em uma abordagem translacional, podemos inferir que o uso de OXA em humanos, principalmente em pacientes que apresentam alguma alteração da função cardíaca, deve ser feito com cautela. No entanto, mais estudos pré-clínicos e clínicos são necessários para avaliar seu uso em doses abusivas. |
| 12 | Google Acadêmico | Achados clínicos causados pelo uso de anabolizantes esteroides por mulheres para fins estéticos. | Souza, A. F.; Lohmann, L. M.; Oliveira, V. H.; Gomes, A. S. | Research, Society and Development, v. 11, n. 14, 2022.                                                                 | Analisar os achados clínicos causados pelo uso de anabolizantes esteroides por mulheres para fins estéticos.                                                   | Mesmo não sendo totalmente aprovado o uso dessas substâncias para fins estéticos, o número de usuários é cada vez maior mesmo com todos os estudos corroborando os riscos cardiovasculares, renais, hepáticos, além das alterações virilizantes.                                                  |

Fonte: AUTOR.

## 5.2.UTILIZAÇÃO DA OXANDROLONA POR MULHERES E EFEITOS DESEJADOS

Os anabolizantes são frequentemente utilizados por mulheres em academias, isso porque, de acordo com o estudo de Naves (2013) os mesmos auxiliam no ganho de massa muscular, dão mais força física, melhoram o desempenho físico e dão mais disposição aos consumidores na hora de malhar. Como dito anteriormente no referencial teórico, o fato de a oxandrolona ter mais efeitos anabólicos que androgênicos torna-a mais atrativa para as mulheres, o que é afirmado em todos os 12 estudos selecionados.

Nos estudos conduzidos por Barbosa (2021) discutiu-se a eficácia da oxandrolona após 5 dias de uso com uma dosagem de 2,5 mg por via oral, quando combinada com exercícios e uma dieta equilibrada. O autor afirmou que esta abordagem auxilia na preservação da massa magra, na redução da retenção de líquidos e na queima de gordura. Dessa forma, como citado por Souza *et al.* (2022), seu uso ajuda no aumento de força por melhorar o depósito intracelular de fosfocreatina. Conforme ambos os autores, é notável que os efeitos colaterais dessa substância são relativamente menores em comparação com outras drogas, embora isso varie dependendo do ciclo de uso e da forma de administração pelas usuárias. De forma complementar, Abreu (2017) afirmou em seu estudo que não há registros que comprovem efeitos colaterais em dose terapêutica da oxandrolona. No entanto, deve-se dar ênfase que a falta de efeitos colaterais se deve ao uso da dose recomendada por especialistas.

Para Naves (2013) e Ronchi (2022) o uso inadequado da oxandrolona para fins estéticos acabou se difundindo popularmente para as mulheres, principalmente pelo fato de estarem descontentes com suas aparências, e acabam combinando seu uso com a frequência nas academias de ginástica, com foco na musculação, como meio de transformar seus corpos e melhorar o que consideram imperfeições. Dessa forma, alcançar um corpo magro, tonificado e com ganho de massa muscular é uma fonte de satisfação, e associar o exercício com o uso de EAA acaba sendo bem aceito por proporcionar resultados mais rápidos.

Neste contexto, é relevante destacar o estudo de Naves (2013) abordou diretamente as experiências das mulheres por meio de entrevistas. Foram entrevistadas 12 mulheres, com idades entre 23 a 46 anos, e foram abordadas sobre suas experiências com anabolizantes e suplementos alimentares. O estudo revelou que 8 delas faziam uso de oxandrolona, ou seja, 67% das entrevistadas. Inicialmente seus objetivos com a utilização de anabolizantes eram relacionados com perda de peso, combate ao

sedentarismo e gosto pela prática de exercícios, no entanto, com o tempo, essas mulheres direcionaram o uso de EAA para o ganho de massa muscular e definição.

Ainda sobre o estudo de Naves (2013) o uso de oxandrolona, segundo as entrevistadas, era em doses entre 10 mg a 25 mg por dia. Com o uso, rapidamente, elas observaram um notável aumento na massa muscular, acompanhado do fortalecimento físico. Além disso, demonstraram satisfação devido à sua forma de administração em comprimidos orais, que oferecia poucos ou nenhum efeito colateral. No entanto, algumas combinavam a oxandrolona com outros anabolizantes para otimizar os resultados.

Em outra pesquisa realizada em Joinville, Santa Catarina, citada por Souza *et al.* (2022), envolvendo 31 mulheres, 13 delas utilizavam a oxandrolona. Destacando a preferência da oxandrolona pelas participantes.

### 5.3.EFEITOS ADVERSOS RELACIONADOS AO USO DE OXANDROLONA

Nos estudos de Orr e Singh (2004), Dias (2016), Abreu (2017), e Marques e Correia (2019) há consenso entre os autores de que a oxandrolona não apresentou efeitos colaterais pronunciados em doses terapêuticas. Dias (2016) sugeriu que isso ocorra devido ao moderado efeito androgênico e ao marcante efeito anabólico da oxandrolona, como mencionado anteriormente. Além disso, de acordo com o estudo de Naves (2013), algumas mulheres que fizeram o uso da oxandrolona afirmaram que não experimentaram efeitos adversos com essa substância em dose terapêutica.

Há discordância entre os autores sobre a dosagem ideal para oxandrolona, Dias (2016) e Barbosa (2021) sugeriram que a dose terapêutica recomendada é de apenas 2 a 5 mg por dia. Entretanto, Naves (2004) afirmou que a posologia indicada é entre 2,5mg e 20mg divididas em 2 a 4 tomadas ao dia. Os estudos concordaram em não haver relatos de efeitos colaterais nessas doses, sugerindo que os riscos estejam relacionados à superdosagem de oxandrolona nas mulheres, podendo ser considerada dose abusiva cerca de 0,06mg/kg por dia para ambos os sexos (Bernadina, 2019; Ronchi, 2021). Comparando as doses indicadas nos artigos com o que é vendido comercialmente em sites de venda online da oxandrolona, aparece principalmente comprimidos nas doses de 10 e 20mg, corroborando com as pesquisas. No entanto, foi encontrada frascos vendidos na dose de 40 mg, ou seja, uma dosagem considerada como abusiva.

Embora tenham sido relatados poucos efeitos adversos significativos em dose terapêutica nos estudos revisados, a oxandrolona tem o potencial de exibir muitos dos efeitos adversos quando usada em doses ou frequência maiores do que as indicadas, e quando associada a outros EAA (Orr; Singh, 2004).

Provavelmente isso é consequência da oxandrolona fazer parte dos EAA 17 $\alpha$ -alquilados que embora aumente a eficácia oral desses compostos, também podem causar hepatotoxicidade (De Souza; Nascimento; Cole, 2013; Marques; Correia, 2019; Corulli, 2020; Ronchi, 2022). Os EAA 17 $\alpha$ -alquilados são prontamente absorvidos no trato gastrointestinal, mas também são eliminados rapidamente devido à sua curta meia-vida. Eles são altamente potentes, no entanto, apresentam maior risco de causar danos ao fígado em comparação com os esteroides anabolizantes que são administrados por via intramuscular (Alves *et al.*, 2015).

Todavia, alguns EAA 17 $\alpha$ -alquilados parecem ter mais probabilidade de hepatotoxicidade do que outros, quando administrados em altas doses (De Souza; Nascimento; Cole, 2013). Com isso, conforme observado no estudo de Marques e Correia (2019) a oxandrolona foi descrita como um anabolizante com baixa hepatotoxicidade. Em concordância, Orr e Singh (2004) afirmaram que não há evidência de toxicidade hepática grave ou irreversível da oxandrolona, embora tenham observado elevações temporárias nos níveis de transaminases hepática e reduções nos níveis de colesterol HDL como as consequências adversas mais comuns em dose de abuso. Por outro lado, estes efeitos parecem ser reversíveis após a interrupção do tratamento.

Corulli (2020) e Sousa *et al.* (2022) observaram que a administração de vários EAA, entre eles a oxandrolona, levou a um aumento nos níveis de triglicerídeos e colesterol total, enquanto resultou em reduções significativas nos níveis de HDL e em aumentos não significativos nos níveis de LDL.

Costa, Lima e Santos (2021) indicaram que no tratamento com oxandrolona para hepatite alcoólica, má nutrição calórica proteica moderada, falha no crescimento físico e em pessoas com síndrome de Turner houve aparecimento de efeitos adversos. Em concordância os estudos de Barbosa (2021) e Ronchi (2022) destacaram os efeitos adversos mais comuns associados ao uso prolongado dessa substância como o afinamento e a oleosidade capilar, alopecia, engrossamento da voz, crescimento de pelos, surgimento de acnes no rosto e corpo, irritação na bexiga, desregulação do ciclo menstrual, hipertrofia do clitóris, aumento da libido, mudanças no humor e perda de características femininas. É relevante salientar que alguns desses efeitos podem ser reversíveis após a interrupção do uso da substância.

Além do mais, como demonstra a tabela 2, esses efeitos da oxandrolona podem ser abrangentes e evidentes nos sistemas sanguíneo, cardiovascular, sistema nervoso central, músculo-esquelético, gastrointestinal, renal, reprodutivo/endócrino e dermatológico, bem como manifestar-se como efeitos psicológicos e comportamentais (Orr; Singh, 2004; Costa; Lima; Santos, 2021).

**Tabela 2** – Efeitos adversos causados por uso abusivo da oxandrolona.

| <b>Dermatológico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Hepático</b>                                                           | <b>Renal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Endócrinos e outros</b>                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afinamento e a oleosidade capilar <sup>1-2</sup> ;<br>Alopécia <sup>1-2</sup> ;<br>Crescimento de pêlos <sup>1-2</sup> ;<br>Surgimento de acnes no rosto e corpo <sup>1-2</sup> .                                                                                                                                                                                      | Elevações temporárias nos níveis de transaminases hepática <sup>7</sup> . | Redução no clearance de inulina indicando uma diminuição na taxa de filtração glomerular <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                | Irritação na bexiga <sup>1-2</sup> ;<br>Engrossamento da voz <sup>1-2</sup> .                                                                                                         |
| <b>Cardiovascular</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Psicológicos</b>                                                       | <b>Sanguíneo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Geniturinário</b>                                                                                                                                                                  |
| Insuficiência cardíaca <sup>2</sup> ;<br>Fibrilação ventricular <sup>2</sup> ;<br>Tromboses <sup>2</sup> ;<br>Doenças isquêmicas <sup>2</sup> ;<br>Infarto agudo do miocárdio <sup>2</sup> ;<br>Redução do relaxamento dos músculos lisos dos vasos sanguíneos <sup>2</sup> ;<br>Inflamações nos tecidos do miocárdio <sup>2</sup> ;<br>Rigidez aórtica <sup>2</sup> ; | Mudanças no humor <sup>1-2</sup> ;<br>Ansiedade <sup>4</sup> .            | Diminuição dos fatores de coagulação <sup>3</sup> ;<br>Aumento do cálcio no sangue <sup>3</sup> ;<br>Leucemia <sup>3</sup> ;<br>Aumento na agregação plaquetária e em fatores pró-coagulantes <sup>2</sup> ;<br>Aumento nos níveis de triglicerídeos e colesterol total <sup>5-6-7</sup> ;<br>Reduções nos níveis de colesterol HDL <sup>5-6-7</sup> . | Desregulação do ciclo menstrual <sup>1-2</sup> ;<br>Atrofia do clitóris <sup>1-2</sup> ;<br>Aumento da libido <sup>1-2</sup> ;<br>Perda de características femininas <sup>1-2</sup> . |
| Fonte: Barbosa (2021) <sup>1</sup> , Ronchi (2022) <sup>2</sup> , Costa, Lima e Santos (2021) <sup>3</sup> , Bernardina et al. (2021) <sup>4</sup> , Corulli (2020) <sup>5</sup> e Sousa et al. (2022) <sup>6</sup> , Orr e Singh (2004) <sup>7</sup> .                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |

Fonte: Autor.

Costa, Lima e Santos (2021) abordaram os efeitos adversos relacionados ao sistema sanguíneo, observando diminuição dos fatores de coagulação, aumento do cálcio no sangue e leucemia.

Ronchi (2021) focou especificamente no sistema cardiovascular e destacou as complicações associadas ao uso da oxandrolona. Essas complicações podem causar danos a vários órgãos e tecidos, sendo o sistema cardiovascular um dos mais afetados. Essas complicações incluem insuficiência cardíaca, fibrilação ventricular, tromboses, doenças isquêmicas e infarto agudo do miocárdio. Seus resultados também revelaram que a oxandrolona promove alterações subclínicas prejudiciais, como o remodelamento cardíaco patológico associado ao aumento da expressão da ECA (enzima conversora de angiotensina) e modificações nas proteínas envolvidas na mobilidade do cálcio. Além disso, podem contribuir para a redução do relaxamento dos músculos lisos dos vasos sanguíneos, devido à diminuição de GMPc (guanosina monofosfato cíclico). O aumento na agregação plaquetária e em fatores pró-coagulantes também pode representar riscos para a saúde cardiovascular. Inflamações nos tecidos do miocárdio e rigidez aórtica também foram apontadas como causas de arritmias nesses indivíduos.

Ronchi (2022) também observou alterações funcionais nos rins, que incluíram uma redução no clearance de inulina, indicando uma diminuição na taxa de filtração glomerular. Essa redução pode estar associada ao depósito de colágeno na ultraestrutura glomerular e ao aumento do estresse oxidativo.

No estudo de Bernardina *et al.* (2021) envolvendo ratos, demonstraram que o tratamento com oxandrolona mesmo em doses terapêuticas, pode induzir comportamentos semelhantes à ansiedade. Os resultados do estudo revelaram que o tratamento de ratos juvenis com oxandrolona durante quatro semanas induziu comportamento semelhante à ansiedade em animais adultos jovens, tanto em doses terapêuticas (0,06 mg/kg/dia), quanto abusivas (15 vezes a dose terapêutica).

Assim, o uso de oxandrolona e outros EAA pode acarretar uma série de efeitos adversos que impactam diversos sistemas do corpo. A administração prolongada dessas substâncias e a dose abusiva podem levar a complicações sérias, tornando crucial considerar esses riscos ao avaliar seu uso. Contudo, são necessários mais estudos para compreender e analisar completamente os efeitos do uso abusivo dessas substâncias.

Pois, há uma evidente falta de compreensão abrangente dos efeitos do uso abusivo da oxandrolona, especialmente em termos de mecanismos farmacológicos. Nesse contexto, a relevância desses estudos reside na contribuição para uma compreensão mais profunda dos riscos associados ao uso da oxandrolona, destacando a necessidade de pesquisas adicionais que aprofundem a análise dos impactos do uso indiscriminado dessas substâncias.

Além disso, paralelamente é crucial abordar a preocupante questão da venda ilegal e do consumo descontrolado da substância, especialmente entre os jovens. A comercialização clandestina frequentemente expõe os consumidores a dosagens abusivas da oxandrolona, representando um sério risco à saúde. A falta de supervisão profissional e o acesso facilitado a doses inadequadas podem resultar em efeitos colaterais prejudiciais e complicações para aqueles que buscam resultados estéticos sem o devido acompanhamento médico.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo diante das informações sobre os possíveis efeitos adversos da oxandrolona e dos EAA na saúde, os estudos evidenciam que muitas mulheres não conseguem se abster do consumo dessas substâncias. Isso destaca a influência significativa que os padrões de beleza e a pressão social exercem

sobre a decisão de usar essas substâncias, com frequência ignorando ou minimizando os riscos potenciais.

Embora alguns artigos sugiram que a oxandrolona seja uma alternativa menos hepatotóxica para tratamentos específicos, a ideia de que essa substância é isenta de efeitos colaterais significativos não é unânime na literatura científica. Portanto, a decisão de usar qualquer anabolizante deve ser tomada com extrema cautela e baseada em informações sólidas, com acompanhamento médico e um profundo entendimento das possíveis consequências para a saúde. Pois, os estudos revisados revelam riscos à saúde feminina, desde efeitos androgênicos e anabólicos desejados até efeitos adversos prejudiciais irreversíveis causados pela oxandrolona. A falta de compreensão completa dos mecanismos farmacológicos, especialmente no contexto do uso abusivo, ressalta a necessidade urgente de pesquisas adicionais para melhor elucidar os riscos associados.

No geral, os estudos analisados refletem a complexidade desse fenômeno, ressaltando a necessidade contínua de investigações adicionais e de uma educação mais ampla sobre os riscos e benefícios associados ao uso da oxandrolona. A saúde deve sempre ser priorizada, e a busca por padrões de beleza deve ser equilibrada com um compromisso com a segurança e bem-estar a longo prazo.

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRAHIN, O. S. C.; DE SOUSA, E. C. Esteroides anabolizantes androgênicos e seus efeitos colaterais: uma revisão crítico-científica. *Revista da Educação Física/UEM*, v. 24, p. 669-679, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/refuem/a/Yp3sBLmsrV7phpZMtsbmCp>>. Acesso em: 12 de set. 2023.
- ABREU, J. F. Esteroides anabólicos androgênicos: uma revisão cronológica. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
- ANTIDOPAGEM, Agência Mundial (WADA-AMA). Código Mundial Antidopagem 2021, 1 jan. 2021.
- ALBANO, G. D. *et al.* Adverse effects of anabolic-androgenic steroids: A literature review. In: *Healthcare*. MDPI, 2021. p. 97.
- ALEMANY, M. The Roles of Androgens in Humans: Biology, Metabolic Regulation, and Health. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 23, n. 19, p. 11952, 2022.
- ALVES, D. M. *et al.* Estimativa da densidade de neurônios da amígdala basolateral e central e avaliação comportamental de camundongos sob o uso de esteroides anabolizantes. Dissertação (Mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde) - Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais. 2015.
- ARAÚJO, M. P. Androgen abuse among recreational athletes. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 41, p. 679-681, 2020.
- BARBOSA, O. J. P. Efeitos prejudiciais provocados pela utilização de anabolizantes esteroides androgênicos (EAA) em mulheres praticantes de fisiculturismo. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2021.
- BARCELOUX, D. G.; PALMER, R. B. Anabolic-androgenic steroids. *Dis Mon*, 59(6), p. 226-48, 2013.
- BERNARDINA, N. R. D. *et al.* Oxandrolone treatment in juvenile rats induced anxiety-like behavior in young adult animals. *Cartas de Neurociência*, 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 372, de 15 de abril de 2020. Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial). *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*. Brasília, DF, 15 abr. 2020.
- CLEMENTE, V. P. Uso de esteróides anabolizantes e seus efeitos em mulheres praticantes de musculação. Artigo (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, f. 27, 2011.
- CISNEIROS, M. G. R., *et al.* O uso de anabolizantes e suas consequências: revisão de literatura / Anabolic steroids use and consequences: literature review. *Brazilian Journal of Health Review*, v.1, n. 5, p. 2372–2385, 2022.
- CORULLI, M. J. S. Levantamento sobre os efeitos positivos e negativos relacionados ao uso de esteroides anabólicos. Revisão de literatura. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Educação Física) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Rio Claro. 2020.

COSTA, A. C. C.; LIMA, E. M.; SANTOS, J. S. Musculação e o uso de esteroides anabolizantes. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 13, p. e581101321462-e581101321462, 2021.

CUNHA, T. S. *et al.* Esteróides anabólicos androgênicos e sua relação com a prática desportiva. *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas/Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*. v. 40, n. 2, 2004.

DE SOUZA, A. O.; NASCIMENTO, A. N.; COLE, E. R. Problemas relacionados ao uso de Esteroides Anabólicos Androgênicos (EAA) por praticantes de musculação e o papel do farmacêutico na educação destes atletas de modo a reduzir o uso indiscriminado. *Infarma-Ciências Farmacêuticas*, v. 25, n. 3, p. 143-154, 2013.

DIAS, J. G. G. J. Uso de esteroides anabólicos andrógenos em praticantes de musculação no Brasil: revisão de literatura médica. Monografia (Graduação em Medicina) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia, Salvador, 2016.

DO CARMO, E. C. Hipertrofia cardíaca e síntese de colágeno induzidos pelo uso de esteroides anabolizantes associado ao treinamento físico por natação em ratos: participação do sistema renina angiotensina aldosterona. Tese de Mestrado (Mestrado em Educação Física) -Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo. 2009.

DO VALE, V. A. L. *et al.* Uso De Esteroides Androgênicos E Seus Efeitos Cardiovasculares Em Atletas Recreativos: Uma Revisão Narrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 2, p. 4461-4474, 2021.

DOMINGOS, G. C. Prevalência do uso de recursos ergogênicos nutricionais e farmacológicos em acadêmicos de bacharelado em educação física de uma universidade do Sul do estado de Santa Catarina. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Universidade do Sul de Santa Catarina, Tubarão, 2020.

DRUGS.COM [Internet]. Oxandrolona Informações de Drugs.com; c2000-2023. [Atualizado: 13 de fevereiro de 2018].

FERREIRA, L. G. Papel do sistema da fosfocreatina na homeostase energética das musculaturas esquelética e cardíaca. São Paulo: Einstein, v. 12, p. 126-131, 2014.

FEST, M. Efeitos colaterais percebidos e temidos pelo uso de esteroides anabolizantes em praticantes de musculação. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina. 2018.

FREITAS, C. F. M. Biomarcadores metabólicos e de stress oxidativo associados ao hipogonadismo masculino. Dissertação (Mestrado em Medicina), Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto, 2023.

GONTIJO, D. A. *et al.* Hepatotoxicidade induzida por esteroides anabolizantes para fins estéticos: relato de caso. 17º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, EXPO CENTRO: Balneário Camboriú-SC, 2023.

GONZAGA, L. J. F. O uso de esteroides androgênicos-anabolizantes em química terapêutica e o seu ilícito no mercado de venda paralelo. Monografia (Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas) - Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra. 2016.

IRIART, J. A. B.; ANDRADE, T. M. Musculação, uso de esteroides anabolizantes e percepção de risco entre jovens fisiculturistas de um bairro popular de Salvador, Bahia, Brasil. *Cadernos de saúde pública*, v. 18, p. 1379-1387, 2002.

KICMAN, A. T. Pharmacology of anabolic steroids. *British journal of pharmacology*, v. 154, n. 3, p. 502-521, 2008.

KOTZÉ, J; ANTONOPOULOS, G. A. Boosting bodily capital: Maintaining masculinity, aesthetic pleasure and instrumental utility through the consumption of steroids. *Journal of Consumer Culture*, v. 21, n. 3, p. 683-700, 2021.

LI, H. *et al.* The efficacy and safety of oxandrolone treatment for patients with severe burns: a systematic review and meta-analysis. *Burns*, v. 42, n. 4, p. 717-727, 2016.

LIMA, A. P.; CARDOSO, F. B. Alterações fisiológicas e efeitos colaterais decorrentes do uso de esteroides anabólicos androgênicos. *Revista Brasileira de Ciências da Saúde*, ano 9, nº 29, 2011.

LISE, M. L. Z. *et al.* O abuso de esteroides anabólico-androgênicos em atletismo. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 45, p. 364-370, 1999.

MACHADO, A. S.; RIBEIRO, B. C. S.; SOARES, D. Efeitos fisiológicos dos esteroides anabólicos androgênicos orais mais utilizados por praticantes de exercícios resistidos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) - Faculdade de Educação e Artes, Universidade do Vale do Paraíba, 2015.

MANTOVANI, G.; MADEDDU, G. MACCIÒ, A. Drugs in development for treatment of patients with cancer-related anorexia and cachexia syndrome. *Drug Design, Development and Therapy*, 7, p. 645-656, 2013.

MARQUES, L. E. Anabolic-Androgenic Steroids: Main Effects. *Corpo e Movimento: Educação Física*. v. 6, n. 1, p. 56-61, 2015.

MARQUES, M. S.; CORREIA, P. A. C. Determinação do perfil de prescrição de oxandrolona e estanozolol em farmácias de manipulação de Vitória Da Conquista no ano de 2019. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 6, p. 34696-34706, 2020.

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. *Bioquímica básica*. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

MOHER, D. *et al.* Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015 statement. *Systematic reviews*, v. 1, n. 4, 2015.

NASCIMENTO, E. R. Problemas relacionados ao uso de Esteroides Anabólicos Androgênicos (EAA) por praticantes de musculação e o papel do farmacêutico na educação destes atletas de modo a reduzir o uso indiscriminado. *Infarma: Ciências Farmacêuticas*. V. 25, Nº 3, 2013.

NAVES, B. D. S. Mulheres, ampolas e músculos: o uso de esteróides anabolizantes em academias de ginástica. Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais) - Universidade de Brasília, Brasília. 95 f, 2013.

NETO, A. P. S.; ACIOLE, E. H. P. Consequências do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes à saúde humana. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano 03, Ed. 10, Vol. 06, pp. 113-124, 2018.

ORR, R.; SINGH, M. F. O esteroide anabólico androgênico oxandrolona no tratamento de distúrbios catabólicos e emagrecedoras: revisão da eficácia e segurança. *Drogas*, v. 7, n. 64, p. 725-50, 2004.

PAPADIMITRIOU, A. *et al.* The anabolic steroid oxandrolone increases muscle mass in prepubertal boys with constitutional delay of growth. *Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism*. v. 14, n. 6 p. 725-728, 2001.

PEREIRA, J. E. T. *et al.* Esteroides anabolizantes androgênicos e seus efeitos colaterais. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 7, n. 3, 2023.

KRASKA, P. B.; BUSSARD, C. R.; BRENT, J. J. Trafficking in Bodily Perfection: Examining the Late-Modern Steroid Marketplace and Its Criminalization. *Justice Quarterly*, 27:2, 159-185, 2010.

REZENDE, G. A. Z.; MUNIZ, B. V. Uso de Esteroides Anabolizantes e os Efeitos Psicológicos. *Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da Falt*. n. 2. Maio, 2020.

ROCHA, M.; AGUIAR, F.; RAMOS, H. O uso de esteroides androgênicos anabolizantes e outros suplementos ergogênicos – uma epidemia silenciosa. *Rev Port Endocrinol Diabetes Metab*. v.2, n. 9, p. 98–105, 2014.

RONCHI, S. N. Impacto do Tratamento com Oxandrolona nas Funções Cardíaca e Renal de Animais Jovens. Tese (Doutorado em Ciências Fisiológicas) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Espírito Santo, 2022.

SILVEIRA, V. T. Tecnologias e a Mulher Atleta: Novas Possibilidades de Corpos e Sexualidades no Esporte Contemporâneo. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2013.

SOUZA, A. F. *et al.* Achados clínicos causados pelo uso de anabolizantes esteroides por mulheres para fins estéticos. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, 2022.

SOUSA, S. *et al.* Perfil de Usuários de Esteroides Anabolizantes no Município de Presidente Prudente-SP. *Revista Brasileira de Nutrição Esportiva*, São Paulo. v. 11. n. 63. p.383-389, 2017.

STEINMANN, A.; KÖRNER, S.; GRAMEL, T. Steroid use among male sports students in Germany. *Performance Enhancement & Health*, 2021.

TORRISI, M. *et al.* Sudden Cardiac Death in Anabolic-Androgenic Steroid Users: A Literature Review. *Medicina (Kaunas)*, v.11, n. 56, p. 587, 2020.

TUMA, M. A. F. *et al.* Blood Hypertension, Food Supplements Consumption And Anabolic Androgenic Steroids In Students Of a Physical Education Course. *Corpo e Movimento: Educação Física*. v. 6, n. 1, p. 17-23, 2015.

# Capítulo 6



10.37423/241109461

## PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E EVOLUÇÃO CLÍNICA DO PÓS-OPERATÓRIO DE APENDICITES AGUDAS EM UM HOSPITAL DO SUL DO BRASIL

*Andressa Maria Carus*


*Universidade do Sul de Santa Catarina*

*Maria Eduarda Coelho da Maia*

*Universidade do Sul de Santa Catarina*

*Kelser de Souza Kock*

*Universidade do Sul de Santa Catarina*



**Resumo: Introdução:** A apendicite aguda é a emergência abdominal mais frequentemente encontrada. Conforme McBurney, em 1894, e reforçado pelo consenso da EAES, em 2015, a apendicectomia é o tratamento padrão ouro. No Brasil, entre 2016 e 2019, a apendicite aguda ocasionou 3.045 óbitos, sendo que destes, 13% foram na região Sul. Portanto, esse estudo pretende averiguar os principais fatores de risco para que assim possam ser detectados no diagnóstico, visando a redução das complicações pós-operatórias. **Metodologia:** Estudo observacional, analítico, quantitativo e descritivo, do tipo coorte retrospectiva. Analisou-se prontuários do sistema de informação hospitalar do HNSC que obtiveram diagnóstico de apendicite aguda (CID K35). **Resultados:** Foram incluídos 301 pacientes. Ao avaliar, verificou-se o perfil da amostra jovem, com predominância do sexo masculino, etnia branca e prevalência do estágio 2 da apendicite. Observou-se prevalência da cirurgia aberta, tendo os pacientes, desta técnica, apresentado maior tempo de espera até sua realização ( $p=0,020$ ) e maior tempo de internação ( $p<0,05$ ) quando comparado a LA. Identificou-se predominância de êmese e náusea (13,9%) como fatores de complicações pós-cirúrgicas. Ressalta-se a maior prevalência de altas hospitalares (99%). **Conclusões:** A idade (menores de 18 anos), febre na entrada hospitalar, êmese pós-operatória e tipo de anestésico possuem relação significativa ( $p<0,05$ ) quando comparados ao estágio da apendicite. Além disso, os pacientes submetidos a técnica cirúrgica aberta apresentam maior percentual de tempo de espera para a cirurgia e tempo de internação.

**Palavras-Chaves:** Apendicite; Abdome agudo; Apendicectomia; Complicações pós-operatórias.

## 1 INTRODUÇÃO

A apendicite aguda (AA) é a emergência abdominal mais frequentemente encontrada<sup>1</sup>. O perfil epidemiológico indica uma maior ocorrência na 2ª ou 3ª décadas de vida, com incidência por ano na Europa e nos Estados Unidos de 100/100.000 habitantes<sup>2,3,4</sup>. No Brasil, no período de janeiro de 2016 a setembro de 2021 foram realizadas 624.975 apendicectomias, destas 97% foram cirurgias com caráter de urgência e 18% foram realizadas no Sul do país<sup>5</sup>.

Ainda que seja uma doença comum, o seu diagnóstico é considerado um desafio, pois os sinais e sintomas são variáveis, podendo ser leves ou até peritonites generalizadas e sepse, como nos traz o consenso *The European Association for Endoscopic Surgery (EAES)*<sup>6</sup>. Contudo, tem ocorrido uma diminuição de sua gravidade pela evolução das formas de diagnóstico e tratamentos<sup>4</sup>.

A apendicite aguda apresenta como principal sintoma a dor abdominal clássica de localização periumbilical ou epigástrica e em 2/3 dos pacientes apresenta migração para fossa ilíaca direita (FID)<sup>7</sup>. Os fatores preditivos de gravidade e complicação são a faixa etária, sendo que idosos apresentam maiores riscos, gênero feminino, tipo de acesso cirúrgico e duração do procedimento, tempo de internação, apendicite grave (fase necrótica, com ou sem perfuração) e necessidade de drenagem na cavidade abdominal<sup>8,9</sup>.

Conforme McBurney, em 1894, e reforçado pelo consenso da EAES, em 2015, a apendicectomia é o tratamento padrão ouro<sup>6,10</sup>. Atualmente, ocorreu evolução das técnicas e equipamentos cirúrgicos; em 2010 uma revisão sistemática *Cochrane* em 67 estudos comparou a cirurgia laparoscópica (LA) versus a cirurgia convencional/aberta (CC) tendo como conclusão que a LA reduziu os casos de infecção do sítio cirúrgico, porém quando comparada a cirurgia aberta, aumentou o risco de abscesso intra-abdominal<sup>11</sup>.

Ainda existem algumas dúvidas sobre o tratamento cirúrgico, principalmente em pacientes com abscesso ou inflamações, um estudo, em 2017, trouxe que nestes casos a cirurgia imediata estava associada a maior morbidade quando comparada ao tratamento não operatório inicial<sup>7</sup>. Todavia, um estudo de coorte mais recente obteve como conclusão que a incidência de complicações pós-cirúrgicas entre as cirurgias imediatas, ou pacientes que realizaram tratamento conservador primeiro, não foi significativa<sup>12</sup>. Além disso, outro estudo de coorte concluiu que nos grupos não operados existe uma alta taxa de recorrência, portanto, o manejo operatório permanece como melhor tratamento<sup>13</sup>.

No Brasil, entre 2016 e 2019, a apendicite aguda ocasionou 3.045 óbitos, sendo que destes, 13% foram na região Sul<sup>14</sup>. Conforme descrito, o tratamento de escolha é a apendicectomia, porém deve-se considerar as complicações pós-cirúrgicas. Portanto, esse estudo visa analisar o perfil epidemiológico e a evolução clínica do pós-operatório de apendicite aguda, para assim favorecer o manejo adequado dos pacientes.

## 2 MÉTODOS

A presente pesquisa trata-se de um estudo observacional, analítico, quantitativo e descritivo, do tipo coorte retrospectiva.

A população do estudo foram todos os pacientes que obtiveram diagnóstico de apendicite aguda (CID K35) no HNSC no período de 01/01/2016 até 31/12/2020. Com base nestes critérios, foram estimados 1257 prontuários. De acordo com esta população (N=1257), proporção desconhecida de desfecho (p=0,5), erro amostral de 5% (d=0,05) e intervalo de confiança de 95% (α=5%), o n foi de 295, conforme equação abaixo:

$$n \geq \frac{N \cdot Z_{(1-\alpha/2)}^2 \cdot p(1-p)}{d^2(N-1) + Z_{(1-\alpha/2)}^2 \cdot p(1-p)}$$

Os prontuários foram aleatorizados para atingir esta amostra. Como critério de exclusão, foram utilizados: Prontuários incorretos, ou de pacientes que foram transferidos; Pacientes que estiverem hospitalizados no período de coleta do estudo, devido à dispensa do TCLE.

Para garantir a homogeneidade deste trabalho foi utilizado um protocolo de pesquisa elaborado pelos autores, que avaliaram os aspectos sociodemográficos, variáveis de entrada hospitalar (sintomas, sinais, exames laboratoriais e de imagens), variáveis da cirurgia (estágio da apendicite, tempo de espera, tipo de anestesia e técnica operatória) e variáveis pós-cirúrgicas (utilização de dreno, complicações, antibioticoterapia e tempo de internação). Bem como, para instrumento de coleta de dados foi utilizado o sistema de informação hospitalar, concedido após autorização prévia da instituição envolvida.

Após a coleta, o banco de dados foi organizado no Excel e analisado pelo *software*-SPSS 20.0. As variáveis quantitativas foram descritas por meio de medidas de tendência central e dispersão dos dados. As diferenças nas proporções serão testadas pelo teste de Qui-quadrado (X<sup>2</sup>) e diferenças de

médias pelo teste t de *Student*, ou equivalentes não paramétricos, conforme adequação dos dados. O nível de significância estatística adotado será de 5% (valor de  $p < 0,05$ ).

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), sendo respeitado os preceitos da resolução N° 4666 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e suas atividades só iniciaram a partir do momento da devida aprovação do mesmo. Encontra-se aprovado sob o código parecer nº 5.180.768, de 20 de dezembro de 2021.

### 3 RESULTADOS

No presente estudo, foram analisados 571 pacientes, sendo que, 270 pacientes foram descartados pelo critério de exclusão, dentre eles, 80 por não possuir registros pré-operatórios, 136 por prontuários sem evolução ou incompletos, e 55 por suspeita diagnóstica descartada. Sendo assim, foram incluídos 301 pacientes. As características da população estudada encontram-se na Tabela 1.

Dentre os 301 pacientes, a apendicite flegmonosa (estágio 2) foi o diagnóstico com maior prevalência, incluindo 111 pacientes (36,9%), seguida da apendicite normal (estágio 1) com 65 pacientes (22,3%) e gangrenosa (estágio 3) com 51 pacientes (16,9%). Além disso, mostrou-se, predominantemente, na etnia branca (273 pacientes, 90,70 %). Em relação as comorbidades, não houve relevância estatística, sendo que 84,7% dos pacientes negou doenças pré-existentes.

No presente estudo, notou-se maior percentual de pessoas mais jovens, 195 pacientes (77,7%) possuem menos que 39 anos, sendo que, 78 pacientes (31,1%) possuem menos de 18 anos. A faixa etária apresentou diferença estatisticamente significativa ( $p < 0,05$ ), em relação a gravidade do estágio de apendicite, representado na Figura 1A. Nos estágios iniciais (1 e 2) constatou prevalência da população entre 18 a 39 anos, contudo, no estágio 3 e 5 apresentaram percentual maior ou total, respectivamente, dos pacientes menores que 18 anos. No entanto, sexo não foi fator preditivo significativo para o estágio da apendicite.

Os principais sintomas de entrada hospitalar foram: dor abdominal (87,7%), dor especifica em FID (69,8%), êmese (38,2%), náusea (33,2%) e febre (21,6%). Visto ainda, significativa relação ( $p = 0,030$ ) entre a porcentagem de pacientes que apresentaram febre em estágios mais avançados de apendicite quando comparados aos estágios iniciais (Figura 1B). Ainda, 104 pacientes (34,6%) apresentaram sinal de Blumberg positivo.

Avaliando os exames laboratoriais solicitados, a maior parte dos pacientes apresentaram leucocitose (59,5%), sendo que, 84 pacientes (27,9%) apresentaram leucócitos acima de  $15.000/\text{mm}^3$ . Ademais, analisando a solicitação de exames de imagem na chegada do paciente no serviço de saúde, o ultrassom (USG) foi o mais utilizado, usado em 192 indivíduos (63,8%), seguido de, respectivamente, raio-X e tomografia computadorizada (TC).

Foram realizadas 298 cirurgias, sendo que 230 (77,1%) de forma convencional, 48 laparoscopias e 23 não possuíam registro. Nas quais, a maior parte dos pacientes receberam anestesia geral (194 pacientes, 64,5%), e o restante raquianestesia. Todavia, houve diferença significativa ( $p=0,007$ ) entre o tipo de anestésico com o estágio da apendicite, indicado na Figura 2A, quanto mais grave o estágio maior o percentual de anestésias gerais utilizadas e consequente diminuição de raquianestésias.

Quando analisado o tipo de cirurgia (LA ou CC), com o tempo de espera entre a entrada no hospital até a realização da cirurgia ( $p=0,020$ ) foi encontrado maior tempo entre aqueles que realizaram cirurgia aberta, indicado na figura 3A. Do mesmo modo, na figura 3B, o tempo de internação em relação ao tipo ( $p<0,05$ ) também foi superior nos pacientes da cirurgia aberta.

As complicações mais prevalentes foram êmese e náuseas, observada em 39 pacientes (13,4%), seguido de febre (5,3%) e peritonites (4,7%). Quando comparado a êmese pós-operatória com o estágio da apendicite foi observada diferença significativa ( $p=0,009$ ), que apresenta maior percentual conforme aumento da gravidade da apendicite (Figura 2B). Outras complicações relatadas foram sepse, obstrução intestinal, abscessos e diarreia, porém não apresentaram fator preditivo significativo quando comparados ao estágio da apendicite.

Contudo, quando questionados sobre a dor após o procedimento, a grande maioria dos pacientes relatou algum grau de desconforto, sendo que 203 pacientes (67,4%) relataram dor leve, 77 pacientes (25,6%) dor moderada e apenas 2 pacientes relataram dor grave.

Após a cirurgia, somente 14,6% (44) pacientes precisaram fazer a utilização de dreno. Em relação ao início da antibioticoterapia, ela ocorreu junto ao momento da indução da anestesia em 102 pacientes (33,9%), enquanto outros 98 pacientes (32,6%) iniciaram ainda no pré-operatório. Dentre as antibioticoterapias utilizadas, as classes que mais prevaleceram foram o nitroimidazólicos (metronidazol), sendo utilizadas por 162 pacientes (53,8%), e as quinolonas, 145 pacientes (48,2%).

Por fim, apenas 5 pacientes precisaram de unidade de terapia intensiva (UTI), mas notou-se uma relação com a gravidade da apendicite ( $p<0,05$ ), com percentual maior conforme maior a gravidade

do apêndice. Ademais, a maior parte dos pacientes obtiveram alta hospitalar (99%), apenas 3 pacientes evoluíram a óbito.

#### 4 DISCUSSÃO

Dentre os principais achados do presente estudo estão o perfil da amostra jovem, com predominância do sexo masculino, etnia branca e prevalência do estágio 2 da apendicite. Além disso, destaca-se o quadro clínico clássico de sinais e sintomas na entrada hospitalar, alta de leucócitos e maior solicitação de USG para diagnóstico. Quanto aos fatores cirúrgicos apresentou prevalência da cirurgia aberta, tendo os pacientes, desta técnica, apresentado maior tempo de espera até sua realização e maior tempo de internação quando comparado a LA. Já nos fatores pós cirúrgicos, identificou-se predominância de êmese e náusea como fatores de complicações pós-cirúrgicas. Toda via ressalta-se a maior prevalência de altas hospitalares, sendo a taxa de mortalidade muito baixa.

Os resultados do presente estudo mostraram maior prevalência da apendicite em estágio 2 (flegmonosa) entre os 301 pacientes analisados, sendo de 36,9%. Estes trabalhos mostram uma prevalência do estágio 2 bastante variada, de 26% a 71,3%<sup>15,16</sup>. O apêndice é innervado pelos plexos celíaco e mesentérico superior, assim, como descrito por Freitas e colaboradores, em 1953, nesta fase ocorre a irritação de filetes simpáticos, relacionados com o plexo solar, que originam a dor epigástrica e periumbilical, acredita-se então que grande maioria dos pacientes procuram atendimento hospitalar após início da dor<sup>17</sup>.

Quanto a etnia, a apendicite aguda apresenta uma relação significativa com a raça branca (90,7%). Esse achado pode estar relacionado as características demográficas, visto que, segundo o IBGE, em 2019, 73,2% da população da região sul se autodeclarou da cor branca<sup>18</sup>. Contudo, esse dado, também, se alinha com o de Petroianu e colaboradores que na análise de 500 prontuários em relação aos aspectos epidemiológicos relacionados à raça, concluiu que os países com predominância da população branca possuem maior incidência de AA, como Dinamarca (17%) e Inglaterra (12%), no entanto, em populações negras, como em países da África, é rara (0,3% e 1%)<sup>19</sup>. Bem como, o estudo de Addiss e colaboradores, também, concluiu que as taxas de apendicite são 1,5 vezes mais altas em brancos do que para não-brancos<sup>20</sup>. Porém, não foi encontrado embasamento científico para essa relação.

No atual estudo, observou-se maior prevalência na população com menos de 39 anos e uma média de 26 anos. Descoberta que corrobora com a análise de Lima e colaboradores, que reafirma esse achado

em seu estudo com 638 pacientes, no qual concluiu maior prevalência de adulto jovens (19-44 anos, 60,03%)<sup>21</sup>. Contudo, não foi encontrado embasamento científico para essa relação.

Quanto a comparação da idade aos estágios da apendicite, notou-se maior percentual de menores de 18 anos nos estágios 3 e 5. Ressalta-se que a principal causa de abdome agudo inflamatório infantil é a apendicite aguda, sendo mais prevalente na faixa etária entre 4 e 14 anos e a indicação mais comum de cirurgia pediátrica abdominal de emergência<sup>22</sup>. Acredita-se que o motivo seja pelo quadro clássico da apendicite ocorrer em menos de 50% das crianças, o que gera um atraso diagnóstico, e corrobora para que a apendicite em menores de 3 anos apresente uma taxa de perfuração de 80% a 100%, já em crianças de 10 a 17 anos a taxa fica em 20%<sup>23</sup>.

Quanto aos sintomas de entrada hospitalar, tiveram maior prevalência a dor abdominal, dor específica em FID, êmese, náusea e febre, respectivamente, ainda 34,6% dos pacientes apresentaram sinal de Blumberg positivo. Corroborando com outros estudos que encontraram essa prevalência de sinais e sintomas<sup>15,24</sup>. Destaca-se, que a febre teve significativa relevância ( $p=0,030$ ) quando comparada ao estágio da doença. Contudo, a história de febre não é patognomônica para apendicite, como demonstra Andersson e colaboradores no seu estudo que detectou que uma temperatura superior a 37,7°C teve uma sensibilidade de 70% e especificidade de 65%<sup>25</sup>. Todavia, a temperatura é um parâmetro importante para pacientes com apendicite, pois quando avaliada no exame seriado foi um importante discriminador de apendicite avançada<sup>26</sup>.

Atualmente, produz-se inúmeros estudos em torno da elevação de glóbulos brancos (WBC) em apendicite. Todavia, não é um marcador específico, pois apresenta aumento em outras condições inflamatórias<sup>25,26</sup>. No presente estudo, notou-se maior leucocitose na grande parte dos pacientes, sendo que 27,9% apresentaram leucócitos acima de 15.000/mm<sup>3</sup>. Contudo, Andersson e colaboradores, em 2003, verificou em sua metanálise com 14 estudos (3.382 pacientes) que glóbulos brancos acima de 10.000 células/mm<sup>3</sup> apresentaram uma sensibilidade e especificidade entre em 83% e 67%, com razão de verossimilhança 2,52 e 0,26, respectivamente. Assim, apenas o número de glóbulos brancos WBC aumentado é insuficiente como modalidade diagnóstica<sup>25,26</sup>.

A respeito dos exames de imagem solicitados na entrada hospitalar, constata-se prevalência do USG. Acredita-se que seja por ser uma ferramenta rápida, não invasiva, sem radiação e com boa sensibilidade e especificidade, como relata Melo e colaboradores em sua revisão sistemática de 121 estudos<sup>27</sup>. Além disso, Doria e colaboradores concluíram em sua análise de 57 estudos que estimativas agrupadas de especificidade foram semelhantes para TC e para US em adultos e crianças, e mesmo

que a sensibilidade seja maior para TC, a exposição à radiação deve ser considerada, principalmente em crianças<sup>28</sup>.

Neste estudo, 99% dos pacientes realizaram a apendicectomia. Este dado, deve-se ao fato do quadro clínico da AA apresentar um rápido progresso do processo inflamatório, assim, requer a remoção imediata a fim de evitar o rompimento do apêndice e peritonite<sup>29</sup>. Ademais, Korndorffer e colaboradores em seu estudo constataram que em 1370 casos de tratamento conservador com antibioticoterapia, ocorreu a recorrência em 263 pacientes. Assim, diretrizes como SAGES 2010 não recomendam o tratamento conservador da apendicite aguda<sup>30</sup>.

Já nas técnicas cirúrgicas, das 298 cirurgias realizadas, 230 foram convencionais (CC) e 48 laparoscópicas (LA). Este dado, corrobora com o estudo de Jurema e colaboradores que constatou que foram realizadas 1.047.388 apendicectomias no SUS, entre 2009 e 2018, sendo que destas 97% foram CC e apenas 3% foram por LA. Bem como, segundo os Anais do II Congresso Médico de Rio Verde (2019), foram realizadas uma média de 103.481 apendicectomias por ano, entre 2008 e 2018, destas, apenas 3,08% foram LA, sendo que, a região Sul realizou 51,6% das LA do Brasil. Fato que, pode ser influenciado pelo valor médio do procedimento, que apresentou uma diferença de 5,64% maior para as laparoscopias pelo SUS, em 2018<sup>32</sup>.

A variável anestésica, apresentou maior prevalência da anestesia geral (64,5%). Esse fato tem relação com a diminuição do desconforto causado pelo pneumoperitônio e pelas mudanças de posição do paciente na mesa cirúrgica com a administração da anestesia geral, além disso, consegue-se controlar a ventilação, afim de evitar hipercarbia<sup>33</sup>. Em contrapartida, o procedimento sob anestesia local apresenta limitações importantes relacionadas à dificuldade de acesso e possibilidade terapêutica mínima<sup>34</sup>. Isso, também, justifica o maior percentual de utilização de anestésias gerais em apendicites de estágios avançados.

Quanto ao tempo de espera entre a entrada no hospital e a realização da cirurgia, os pacientes que realizaram CC apresentaram maior tempo (média de 14,39 horas). Segundo estudos, o atraso aumenta o risco de perfuração da apendicite, o que leva a maior incidência de morbidade<sup>35</sup>. Entretanto, na Nova Zelândia, o estudo de Omundsen e colaboradores não encontrou diferença significativa na comparação entre pacientes que esperaram menos de 12 horas com aqueles entre 12-24 horas, apenas, quando comparado com uma espera maior que 24 horas, estes então apresentavam mais abscessos e taxas de perfurações e maior tempo de permanência pós-operatória<sup>36</sup>.

A respeito do tempo de internação, foi identificado maior tempo nos pacientes da cirurgia aberta quando comparado aos da LA. Este achado se alinha com outros estudos, em que encontraram tempos de internação menores para os pacientes que realizaram LA, provavelmente por terem realizado incisões menores o que garante diminuição da dor e mobilização mais precoce<sup>37,38</sup>. Ademais, Ingraham e colaboradores, realizaram uma revisão com os casos de 222 hospitais participantes do Programa Nacional de Melhoria da Qualidade Cirúrgica da Faculdade Americana de Cirurgiões que constatou maiores taxas de morbidade geral, morbidade grave, infecção do sítio cirúrgico e morbidade/mortalidade grave entre os pacientes submetidos à cirurgia aberta<sup>39</sup>.

Segundo estudos, ocorre variação de 3 a 28,7% na incidência de complicações pós-operatórias, que incluem pequenas obstruções intestinais, infecção do sítio cirúrgico, abscesso intra-abdominal, vazamento de coto e apendicite de coto<sup>40</sup>. No entanto, no presente estudo, não foi encontrada diferença significativa destas complicações quando comparadas ao estágio da apendicite.

Já nas variáveis das complicações, destaca-se que as mais prevalentes foram êmese e náuseas, que apresentaram diferença significativa quando comparadas ao estágio da apendicite. Abreu e colaboradores relatam que esses sintomas podem ser provocados por duas variáveis, local e a duração da cirurgia (fatores relacionados à cirurgia) ou ventilação sob máscara e utilização de drogas com potencial emetogênico (fatores relacionados à anestesia)<sup>41</sup>.

Quanto aos achados de dor, a grande maioria dos pacientes relatou algum grau de desconforto. Segundo alguns estudos, é possível relatar que a LA permite aos pacientes uma recuperação mais rápida, pois não há ruptura importante de músculos e fáscias, com menos duração e intensidade da dor<sup>42</sup>. Porém, outra evidência concluiu não haver distinções significativas entre os grupos em relação à analgesia pós operatória, de forma que a administração de morfina, paracetamol e outros narcóticos foi semelhante<sup>43</sup>.

A respeito da utilização de drenagem abdominal, apenas 14,6% (44) pacientes necessitaram do uso. Destaca-se que essa prática vem sendo contestada após alguns estudos constatarem que o uso rotineiro de dreno não reduz a incidência de abscessos e causa aumento do tempo operatório<sup>44,45</sup>. Além disso, os pacientes sem dreno apresentaram significativamente menos complicações gerais e relata-se benefício significativo para o tempo de recuperação e tempo de internação<sup>46</sup>.

A flora bacteriana, nas apendicites agudas complicadas, apresentou culturas positivas para anaeróbios mistos e anaeróbios, principalmente para *Escherichia coli*, *Streptococcus grupo milleri* e *Pseudomonas aeruginosa*<sup>47</sup>. No presente estudo, a iniciação da antibioticoterapia prevaleceu junto ao momento da

indução da anestesia e dentre as utilizadas, as classes que mais predominaram foram o nitroimidazólicos (metronidazol) e as quinolonas. Tais resultados corroboram com o estudo retrospectivo, realizado na França, desenvolvido por 20 anos (períodos 1989–1991, 1999–2000 e 2009–2010), que não identificou aumento significativo de resistência das enterobactérias, assim a amoxicilina com clavulanato, imipenem e metronidazol permanecem eficazes<sup>48</sup>.

Por fim, quanto a utilização da UTI, apenas 5 pacientes foram encaminhados, mas nota-se uma relação com a gravidade da apendicite. Ademais, a vasta maioria dos pacientes obtiveram alta hospitalar (99%) e apenas 3 pacientes evoluíram a óbito. Fato que corrobora com o estudo de Bhangu e colaboradores, que constatou que a taxa de mortalidade nos países desenvolvidos está entre 0,09 e 0,24%. Porém, a taxa é maior nos países em desenvolvimento, como o Brasil, entre 1 e 4%<sup>49</sup>. Por outro lado, pode-se também relacionar a morbidade a técnica operatória, visto que à técnica aberta é mais cruenta e está mais relacionada a infecção operatória. No SUS, entre 2009 e 2018 foram constatados 2.651 óbitos pela técnica convencional, enquanto que tiveram apenas 25 casos pela LA. Contudo, é importante ressaltar que o número de cirurgias convencionais é quase 30 vezes maior<sup>31</sup>.

Este estudo apresenta algumas limitações. Uma das limitações reside no caráter retrospectivo das informações, que pode ocasionar imprecisões no registro dos dados, o que pode afetar a generalização dos resultados. Além disso, a condição retrospectiva pode aumentar o erro de medição, pois não há controle sobre as fontes de informação e é difícil ajustar por outros fatores preditores durante a análise.

## 5 CONCLUSÃO

A análise da amostra dos pacientes verificou prevalência de jovens (77,7%), sexo masculino e raça branca (90,7%). Além disso, identifica-se relação significativa ( $p < 0,05$ ) entre as fases mais avançadas de apendicite e os pacientes menores de 18 anos.

Em relação a entrada hospitalar, os sintomas mais prevalentes foram dor abdominal (87,7%), dor específica em FID (69,8%), êmese (38,2%), náusea (33,2%) e febre (21,6%). Tendo a febre significativa relação com o estágio de apendicite ( $p = 0,030$ ). Ademais, a maioria dos pacientes apresentaram leucocitose (59,5%) e realizaram USG (63,8%).

O presente estudo relatou que dentre os tempos avaliados, os pacientes que realizaram cirurgia convencional apresentaram maior tempo de espera para a realização da cirurgia ( $p = 0,02$ ) e maior tempo de internação ( $p < 0,05$ ) quando comparados a cirurgia laparoscópica. Ademais, a maioria dos

pacientes utilizou anestesia geral (64,5%), tendo relação significativa com o estágio da apendicite ( $p=0,007$ ), e realizaram antibioticoterapia no momento de indução da anestesia, sendo mais utilizado o metronidazol (53,8%).

Nos achados pós-operatórios, identifica-se relação significativa dos sintomas de êmese e náusea quando comparadas ao estágio da apendicite, a grande maioria apresentou desconforto e apenas 14,6% dos pacientes precisaram utilizar drenagem na cavidade abdominal. Ressalta-se que apenas 5 pacientes precisaram utilizar a UTI e 3 pacientes evoluíram a óbito.

Concluiu-se, então, que a idade (menores de 18 anos), febre na entrada hospitalar, êmese pós-operatória e tipo de anestésico possuem relação significativa quando comparados ao estágio da apendicite. Além disso, os pacientes submetidos a técnica cirúrgica aberta apresentam maior percentual de tempo de espera para a cirurgia e tempo de internação. Assim, o estudo do perfil epidemiológico e dos preditores perioperatórios mais relacionados às complicações pós-cirúrgicas favorecem o manejo adequado dos pacientes.

## 7 REFERÊNCIAS

1. Coelho JCU. Aparelho Digestivo: clínica e cirurgia. São Paulo: Editora Atheneu, 2005; V2:862-868
2. Rodrigues JJG, Machado MCC, Rasslan S. Clínica Cirúrgica. Barueri, São Paulo: Manole 2008; V2:1557-1558.
3. Saunders Company. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice. Translation of the sixteenth English language edition, 2003. V2: 1008-1017.
4. Fortea-Sanchis, C .et al. “Apendicectomía laparoscópica frente al abordaje abierto para el tratamiento de la apendicitis aguda” [Laparoscopic appendectomy vs open approach for the treatment of acute appendicitis]. Revista de gastroenterologia de Mexico vol. 77,2 (2012): 76-81.
5. TabNet Win32 3.0: *Procedimentos hospitalares do SUS - por local de internação - Brasil*. (n.d.). Acessado em 29 de Novembro, 2021. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qiuf.def>
6. Gorter RR, Eker HH, Gorter-Stam MAW, Abis GSA, Acharya A, Ankersmit M, et al. Diagnosis and management of acute appendicitis. EAES consensus development conference 2015. Surg Endosc. novembro de 2016;30(11):4668–90.
7. Andersson RE, Petzold MG. Tratamento não cirúrgico de abscesso apendicular ou flegmão: uma revisão sistemática e meta-análise. Annals of Surgery. novembro de 2007; 246 (5): 741–8.
8. Moreira LF, Garbin HI, Da-Natividade GR, Silveira BV, Xavier TV. Fatores preditores de complicações pós-operatórias em apendicectomias. Rev Col Bras Cir [Internet]. 14 de novembro de 2018 [citado 29 de novembro de 2021];45(5). Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S010069912018000500155&lng=pt&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010069912018000500155&lng=pt&tlng=pt)
9. Silva SM e, Almeida SB de, Lima OAT, Guimarães GMN, Silva ACC da, Soares AF. Fatores de risco para as complicações após apendicectomias em adultos. Rev bras colo-proctol. março de 2007;27(1):31–6.)
10. McBURNEY C. A incisão feita na parede abdominal em casos de apendicite, com a descrição de um novo método de operação: Anais de Cirurgia. julho de 1894; 20: 38–43.
11. Sauerland S, Lefering R, Neugebauer E. Laparoscopic versus cirurgia aberta para suspeita de apendicite. In: The Cochrane Collaboration, organizador. O Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas [Internet]. Chichester, Reino Unido: John Wiley & Sons, Ltd; 2002 [citado em 25 de novembro de 2021]. p. CD001546. Disponível em: <https://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD001546>
12. Kim JK, Ryoo S, Oh HK, Kim JS, Shin R, Choe EK, et al. Management of Apendicitis Presenting with Abscess or Mass. J Korean Soc Coloproctol. 2010; 26 (6): 413.
13. Deelder JD, Richir MC, Schoorl T, Schreurs WH. Como tratar uma massa inflamatória do apêndice: operatório ou não? J Gastrointest Surg. abril de 2014; 18 (4): 641–5.

14. *TabNet Win32 3.0: Mortalidade* - Brasil. (n.d.). Acessado em 29 de Novembro, 2021. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def>
15. Iamarino APM, Juliano Y, Rosa OM, Novo NF, Favaro MDL, Ribeiro Júnior MAF. Risk factors associated with complications of acute appendicitis. *Rev Col Bras Cir.* dezembro de 2017;44(6):560–6.
16. Reis JM dos, Oliveira DCN de, Lucatto TM, Júnior WB dos R. Diagnóstico e tratamento de 300 casos de apendicite aguda em crianças e adolescentes atendidos em um hospital universitário. 18(1):11–5.
17. Freitas, P. A. de. (1953). Apendicite aguda. *Revista De Medicina*, 37(205), 43-50. <https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v37i205p43-50>
18. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [homepage na internet]. Características gerais dos domicílios e dos moradores 2019 [acesso em 17/10/2022]. Disponível em: [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707\\_informativo.pdf](https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf)
19. Petroianu A, Oliveira-Neto JE de, Alberti LR. Incidência comparativa da apendicite aguda em população miscigenada, de acordo com a cor da pele. *Arq Gastroenterol.* março de 2004;41(1):24–6.
20. Addiss DG, Shaffer N, Fowler BS, Tauxe RV. The Epidemiology of Appendicitis and Appendectomy in The United States. *American Journal of Epidemiology.* novembro de 1990;132(5):910–25.
21. Lima AP, Vieira FJ, Oliveira GPDM, Ramos PDS, Avelino ME, Prado FG, et al. Clinical-epidemiological profile of acute appendicitis: retrospective analysis of 638 cases. *Rev Col Bras Cir.* agosto de 2016;43(4):248–53.
22. Tavares PB. Urgência em cirurgia pediátrica. *Revista de pediatria SOPERJ.* 2012;13(2):35–42.
23. Pepper VK, Stanfill AB, Pearl RH. Diagnosis and Management of Pediatric Appendicitis, Intussusception, and Meckel Diverticulum. *Surgical Clinics of North America.* junho de 2012;92(3):505–26.
24. Jones MW, Lopez RA, Deppen JG. Appendicitis. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 [citado 16 de outubro de 2022]. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493193/>.
25. Andersson RE, Hugander AP, Ghazi SH, Ravn H, Offenbartl SK, Nyström PO, et al. Diagnostic Value of Disease History, Clinical Presentation, and Inflammatory Parameters of Appendicitis. *World J Surg.* fevereiro de 1999;23(2):133–40.
26. Shogilev D, Duus N, Odom S, Shapiro N. Diagnosing Appendicitis: Evidence-Based Review of the Diagnostic Approach in 2014. *WestJEM.* 1o de novembro de 2014;15(7):859–71.
27. Melo B, Lopes HA, Carpaneda J de M, Moraes JACF, Barbosa AB, Bezzan IGB, et al. Ultrassom FAST-aplicabilidade em pacientes hemodinamicamente instáveis na emergência: FAST ultrasound - applicability in hemodynamically unstable patients in emergency. *BJDV.* 2 de setembro de 2022;8(9):60690–4.
28. Doria AS, Moineddin R, Kellenberger CJ, Epelman M, Beyene J, Schuh S, et al. US or CT for diagnosis of appendicitis in children and adults: a meta-analysis [Internet]. Database of Abstracts of Reviews of

Effects (DARE): Quality-assessed Reviews [Internet]. Centre for Reviews and Dissemination (UK); 2006 [citado 16 de outubro de 2022]. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK73075/>

29. Ben-David K, Sarosi GA Jr. Apendicite. Em: Feldman M, Friedman LS, Brandt LJ, eds. Doenças gastrointestinais e hepáticas de Sleisenger & Fordtran. 9ª edição. Filadélfia, PA: Elsevier Saunders; 2010:cap 116.

30. Korndorffer JR, Fellingner E, Reed W. SAGES guideline for laparoscopic appendectomy. Surg Endosc. abril de 2010;24(4):757–61.

31. Jurema HG de M, Mostardeiro LR, Menezes LO de. Apendicectomia convencional versus videolaparoscópica pelo SUS: estudo descritivo e transversal sobre as internações hospitalares no Brasil. Saúde (Sta Maria) [Internet]. 19 de agosto de 2020 [citado 17 de outubro de 2022];46(2). Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/revistasauade/article/view/45310>

32. Anais do II Congresso Médico de Rio Verde. REAS [Internet]. 18dez.2019 [citado 17out.2022];(1):e2706. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2706>

33. Cunningham AJ, Brull SJ. Laparoscopic Cholecystectomy: Anesthetic Implications. Anesthesia & Analgesia. maio de 1993;76(5):1120–1133.

34. Pitombo M, Maya MC, Guimarães-Filho MA, Melgaço A de S. O uso da laparoscopia no abdome agudo. Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto (TÍTULO NÃO-CORRENTE) [Internet]. 2009 [citado 17 de outubro de 2022];8(1). Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/9230>

35. Cappendijk VC. The impact of diagnostic delay on the course of acute appendicitis. Archives of Disease in Childhood. 1o de julho de 2000;83(1):64–6.

36. Omundsen M, Dennett E. Delay to Appendectomy and associated Morbidity: A Retrospective Review. ANZ J Surg. março de 2006;76(3):153–5.

37. Ali R, Anwar M, Akhtar J. Laparoscopic versus open appendectomy in children: a randomized controlled trial from a developing country. Journal of Pediatric Surgery. fevereiro de 2018;53(2):2479.

38. Khalil J, Muqim R, Rafique M, Khan M. Laparoscopic versus open appendectomy: A comparison of primary outcome measures. Saudi J Gastroenterol. 2011;17(4):236.

39. Ingraham AM, Cohen ME, Bilimoria KY, Pritts TA, Ko CY, Esposito TJ. Comparison of outcomes after laparoscopic versus open appendectomy for acute appendicitis at 222 ACS NSQIP hospitals. Surgery. outubro de 2010;148(4):625–37.

40. Lau DHW, Yau KKK, Chung CC, Leung FCS, Tai YP, Li MKW. Comparison of Needlescopic Appendectomy Versus Conventional Laparoscopic Appendectomy: A Randomized Controlled Trial. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. abril de 2005;15(2):75–9.

41. Abreu MP de, Vieira JL, Silva IF da, Miziara LEFG, Fófano R. Eficácia do ondansetron, metoclopramida, droperidol e dexametasona na prevenção de náusea e vômito após laparoscopia ginecológica em regime ambulatorial. Estudo comparativo. Rev Bras

Anesthesiol [Internet]. fevereiro de 2006 [citado 17 de outubro de 2022];56(1). Disponível em: [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-70942006000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-70942006000100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt)

42. Paya K, Rauhofer U, Rebhandl W, Deluggi St, Horcher E. Perforating appendicitis: An indication for laparoscopy? Surg Endosc. fevereiro de 2000;14(2):182–4.

43. (LITTLE DC, CUSTER MD, MAY BH, et al. Laparoscopic appendectomy: An unnecessary and expensive procedure in children? J Pediatr Surg. v. 37, n 3. p. 310-317, 2002

44. Little DC, Custer MD, May BH, Blalock SE, Cooney DR. Laparoscopic appendectomy: An unnecessary and expensive procedure in children? Journal of Pediatric Surgery. março de 2002;37(3):310–7.

45. Akkoyun İ, Taş Tuna A. Advantages of abandoning abdominal cavity irrigation and drainage in operations performed on children with perforated appendicitis. Journal of Pediatric Surgery. outubro de 2012;47(10):1886–90.

46. Allemann P, Probst H, Demartines N, Schäfer M. Prevention of infectious complications after laparoscopic appendectomy for complicated acute appendicitis—the role of routine abdominal drainage. Langenbecks Arch Surg. janeiro de 2011;396(1):63–8.

47. Roque FMCB, Melo Filho AA, Roque AJCB, Roque HCB, Moreira TMM, Chaves EMC. Antibiotics for Appendectomy in Children and Adolescents during the Perioperative Period: Na integrative Review. Rev paul pediatr. dezembro de 2019;37(4):494–502.

48. Schmitt F, Clermidi P, Dorsi M, Cocquerelle V, Gomes CF, Becmeur F. Bacterial studies of complicated appendicitis over a 20-year period and their impact on empirical antibiotic treatment. Journal of Pediatric Surgery. novembro de 2012;47(11):2055–62.

49. Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH, Drake FT. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. The Lancet. setembro de 2015;386(10000):1278–87

## FIGURAS E TABELA

**Tabela 1** = Amostra de pacientes, que obtiveram diagnóstico de apendicite aguda (CID K35) no HNSC no período de 01/01/2016 até 31/12/2020.


|                              |                 |     |      | (Continua)        |
|------------------------------|-----------------|-----|------|-------------------|
|                              |                 | N   | %    | Mediana (p25-p75) |
| <b>Sexo</b>                  |                 |     |      |                   |
|                              | Feminino        | 120 | 39,9 |                   |
|                              | Masculino       | 181 | 60,1 |                   |
| <b>Idade (anos)</b>          |                 |     |      | 26 (16,0 - 37,50) |
|                              | <18 anos        | 90  | 29,9 |                   |
|                              | 18 a 39 anos    | 142 | 47,2 |                   |
|                              | 40 a 59 anos    | 46  | 15,3 |                   |
|                              | ≥60 anos        | 23  | 7,6  |                   |
| <b>Cor</b>                   |                 |     |      |                   |
|                              | Branca          | 273 | 90,7 |                   |
|                              | Outros          | 18  | 6,0  |                   |
|                              | Dados Faltantes | 10  | 3,3  |                   |
| <b>Estágio da apendicite</b> |                 |     |      |                   |
|                              | Normal          | 67  | 22,3 |                   |
|                              | Flegmonosa      | 111 | 36,9 |                   |
|                              | Gangrenosa      | 51  | 16,9 |                   |
|                              | Perfurada       | 20  | 6,6  |                   |
|                              | Abscesso        | 2   | 0,7  |                   |
|                              | Dados Faltantes | 50  | 16,6 |                   |

**Tabela 1** = Amostra de pacientes, que obtiveram diagnóstico de apendicite aguda (CID K35) no HNSC no período de 01/01/2016 até 31/12/2020.

|                                   |     |      | (Conclusão)        |
|-----------------------------------|-----|------|--------------------|
|                                   | N   | %    | Mediana (p25-p75)  |
| <b>Tempo de internação (dias)</b> |     |      | 1,87 (1,47 - 2,89) |
| <b>Dreno</b>                      |     |      |                    |
| Sim                               | 44  | 14,6 |                    |
| Não                               | 252 | 83,7 |                    |
| Dados Faltantes                   | 5   | 1,7  |                    |
| <b>UTI</b>                        |     |      |                    |
| Sim                               | 5   | 1,7  |                    |
| Não                               | 296 | 98,3 |                    |
| <b>Desfecho</b>                   |     |      |                    |
| Alta                              | 298 | 99,0 |                    |
| Óbito                             | 3   | 1,0  |                    |

Legenda: N: Número; %: Porcentagem Fonte: Andressa Maria Carus (2022)

**Figura 1** – Associação entre o estágio da apendicite com a faixa etária (A) e a frequência de febre nos sintomas iniciais (B).




Legenda: 1: Normal; 2: Flegmonosa; 3: Grangrenosa; 4: Perfurada; 5: Abscesso

Nível de significância calculado por meio de teste qui-quadrado.

Fonte: Compilação do autor.

**Figura 2** – Associação entre o estágio da apendicite com a frequência de êmese pós-operatória (A) e o tipo de anestesia (geral balanceada ou raquianestesia) utilizada (B).




Legenda: 1: Normal; 2: Flegmonosa; 3: Grangrenosa; 4: Perfurada; 5: Abscesso

Nível de significância calculado por meio de teste qui-quadrado.

Fonte: Compilação do autor;

**Figura 3** - Associação entre o tipo de cirurgia (aberta ou laparoscópica) com o tempo de espera para a cirurgia em horas (A) e o tempo de internação em dias (B).



Nível de significância calculado por meio de teste qui-quadrado. Fonte: Compilação do autor;

# Capítulo 7



10.37423/241109462


## A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA ALIADA AOS EXERCÍCIOS LÚDICOS NO BEM-ESTAR DE IDOSOS ACIMA DE 80 ANOS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA

*Thais Caroline Casagrande*

*Centro Universitário de Pato Branco*

*Bianca Tâmela Kapazi*

*Centro Universitário de Pato Branco*



## INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento ocorre nos seres vivos, sendo uma fase com grande perda funcional, cognitiva e social, que são geradoras de limitações para a pessoa idosa, associando-se a uma fase da vida em que o sistema imunológico está perdendo a sua eficiência (BARBOSA *et al*, 2017). Diante disso a família encontra dificuldades e desafios para o desempenho da função de cuidadora desses idosos, buscando a institucionalização, local que poderá proporcionar o suporte fisioterapêutico adequado.

## OBJETIVO

Verificar na bibliografia a importância da fisioterapia aliada aos exercícios lúdicos na saúde de idosos acima de 80 anos que se encontram institucionalizados.

## METODOLOGIA

A pesquisa em questão refere-se a uma revisão de literatura, sendo uma pesquisa descritiva e estudo quantitativo. A coleta de dados foi em artigos já publicados nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO. Para a seleção do mesmo foi adotado o critério de inclusão: artigo originais publicados entre os anos de 2006 a 2022. O critério de exclusão foi não encontrar o texto completo. Os descritores utilizados foram “Fisioterapia, idoso institucionalizados e lúdico” com as expressões booleanas *end*.

## RESULTADOS

Para a discussão e análise dos resultados foram selecionados 16 artigos, após a leitura dos resumos restaram 6 artigos em texto completo referentes a temática demonstrando que muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas no âmbito da fisioterapia relacionada a promoção da saúde do idoso. Em síntese os autores ressaltam que o objetivo primordial da fisioterapia nas instituições de longa permanência é manter o máximo da capacidade funcional e independência física e mental no meio onde está inserido.

## DISCUSSÃO

Foi possível analisar que as instituições oferecem a pessoa idosa assistência adequada e específica para cada indivíduo. Entre os profissionais que compõe a equipe multidisciplinar está o fisioterapeuta, que tem o objetivo de promover atividades para essa faixa etária que deverão ser constituídas de exercícios lúdicos para que assim haja maior engajamento dessa população. Essas atividades influenciam de forma positiva na inclusão social e promoção de saúde para o envelhecimento ativo.

## CONCLUSÃO

O envelhecimento populacional é crescente na população brasileira, neste contexto, é importante que o fisioterapeuta esteja inserido na equipe que atua na geriatria com os objetivos de prevenção, tratamento e reabilitação funcional causadas pelo processo de envelhecimento. Os exercícios lúdicos promovem maior engajamento na população idosa institucionalizada pois proporcionam atividades prazerosas, que instigam memórias afetivas e incentivadora dos aspectos físicos e socioemocionais.

**Palavras – chave:** Idosos; Lúdico; Fisioterapia; Bem-estar; Institucionalização.

## REFERÊNCIAS

BARBOSA, Liliam Moretto et al. A fisioterapia voltada para idosos dependentes em instituição de longa permanência: relato de experiência. Anais do XXII Seminário interinstitucional de ensino, pesquisa e extensão Redes e territórios, 2017.

BRAMANTE, A. C. Lazer: concepções e significados. Belo Horizonte: Licere, vol.1, nº.1, p.09-17, 1998.

BRASIL. Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Brasília: MPAS, 1994. \_\_\_\_\_. Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília: Ministério da saúde, 2006.

MIRANDA, G. M. D.; MENDES, A. C. G.; SILVA, A. L. A. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequências sociais atuais e futuras. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. v.19, n. 3, p. 507-519, 2016.

TAMAI, S. (1997). Epidemiologia do Envelhecimento no Brasil. Em O. V. Forlenza, & O. P. Almeida. Depressão e Demência no Idoso – Tratamento Psicológico e Farmacológico São Paulo: Lemos.

TAVARES, L. Estimulação em idosos institucionalizados: efeitos da prática de atividades cognitivas e atividades físicas. 2007. 215 f. Dissertação de (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

ROCHA, Jorge Afonso da. O envelhecimento humano e seus aspectos psicossociais. Revista FAROL, v. 6, n. 6, p. 78-89, 2018.

## Capítulo 8



10.37423/241109464

# EFEITOS DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM UM INDIVÍDUO POS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO: UM ESTUDO DE CASO

*Fernanda Jesus da Silva*


*Hospital São José Jaraguá do Sul*

*Jessica Fernanda Zoz Bolomini*

*Hospital São José Jaraguá do Sul*

*Gideane Borges Gai*

*Hospital São José Jaraguá do Sul*



## INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), é uma das principais causas de morte e incapacidade, sendo classificado como AVC isquêmico e AVC hemorrágico (BARELLA, et al). A mobilização precoce pode ser iniciada na UTI, sendo capaz de reduzir a incidência de fraqueza adquirida (ANJOS et al., 2021). A mobilização precoce acelera a recuperação, é segura e eficaz, previne complicações e reduz custos de internação (ZHANG et al., 2019).

## OBJETIVO:

Com base no exposto acima, este estudo teve como objetivo descrever os efeitos da mobilização precoce relacionada ao equilíbrio, força, desempenho motor, incapacidade e risco de queda em um indivíduo pós AVCi (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico).

## MÉTODO:

O equilíbrio foi avaliado pela escala de Berg (SCALZO et al., 2009), já o desempenho motor pela *Motor Assessment Scale* (MAS) (WANDERLEY et al., 2015). Para estimar força muscular a Medida da Função Motora (MFM) (IWABE; MIRANDA-PFEILSTICKER; NUCCI, 2008). A escala *Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool* (JH-FRAT) (MARTINEZ et al., 2009) aferiu risco de queda e a Rankin analisou a incapacidade (CINCURA et al., 2008). Este estudo não foi submetido ao comitê de ética em pesquisa em seres humanos.

## RESULTADOS:

Os escores iniciais do indivíduo pós AVCi no momento de sua admissão hospitalar foram, na escala Berg 3 pontos; MAS 12 pontos; MFM escore 28; JH-FRAT e Rankin tiveram 4 como pontuação. Após 5 meses de tratamento fisioterapêutico, sendo 55 atendimentos realizados, 3 vezes semanais, o paciente supracitado teve alta. Suas pontuações nas escalas no momento da alta foram Berg 52 pontos; MAS 45 pontos; MFM com escore de 56; JH-FRAT 8 pontos e Rankin com pontuação 1.

## DISCUSSÃO:

As técnicas utilizadas durante as sessões incluíram treino de sentar e levantar, cicloergômetro, descarga de peso, facilitação neuromuscular proprioceptiva, exercícios resistidos, eletroestimulação, fortalecimento global, treino de equilíbrio e marcha. Criecking e colegas (2019) relatam que o

treinamento de tronco pode melhorar significativamente a mobilidade, equilíbrio e controle de tronco. Uivarosan e colaboradores (2019) afirmam benefícios na associação de técnicas na reabilitação pós AVC.

#### CONCLUSÃO:

Tendo em vista a evolução do quadro para hemiparesia leve, ortostase sem apoio e deambulação independente o paciente ganhou alta ao final do tratamento. Tais achados sugerem que a mobilização precoce aliada ao tratamento fisioterapêutico pode gerar resultados positivos no tratamento de indivíduos acometidos com AVCi. É importante salientar que este estudo é um relato de caso e sugere-se novas pesquisas relacionadas ao tema com número amostral maior.

## REFERÊNCIAS:

ANJOS, Jorge Luis Motta Dos; et al. Mobilização Precoce Pós Acidente Vascular Cerebral na Fase Aguda: Revisão Integrativa. *Rev. Neurociências*, v. 29, p. 1-18, 2021.

BARELLA, Rudieri Paulo; et al. PERFIL DO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL EM UM HOSPITAL FILANTRÓPICO DO SUL DE SANTA CATARINA E ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE AVC. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, Florianópolis, v. 1, n. 48, p. 131-143, mar. 2019. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/1023423/432-1341-2-rv.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2023.

CINCURSA, C; PONTES-NETO, OM; NEVILLE, IS; et al. Validação da National Institutes of Health Stroke Scale, Escala de Rankin modificada e Índice de Barthel no Brasil: o papel da adaptação cultural e da entrevista estruturada. *Doenças Cerebrovasculares (Basileia, Suíça)*. v. 27, n. 2, p. 119-122, 2009. DOI: 10.1159/000177918.

DIANA, U; DELIA, MT; CIPRIAN, L; et al. Effects of combining modern recovery techniques with neurotrophic medication and standard treatment in stroke patients. *Science of The Total Environment*. v. 679, p. 80-87, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.070>.

IWABE, C; MIRANDA-PFEILSTICKER, B; NUCCI, A. Medida da função motora: versão da escala para o português e estudo de confiabilidade. *Braz J Phys Ther*. v. 12, n. 5, p. 417-424, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-35552008000500012>

MARTINEZ, MC; IWAMOTOLL, VE; LATORRE, MRDO; et al. Validade e confiabilidade da versão brasileira da Johns Hopkins Fall Risk Assessment Tool para avaliação do risco de quedas. *Rev. Bras. Epidemiol*. v. 22, p. 1-14, 2019. DOI: 10.1590/1980-549720190037.

OLIVEIRA, Juçara Loli de et al. Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico: foco em pesquisa. In: 8º CONGRESSO INTERNACIONAL EM SAÚDE, 8., 2021, Ijuí. *Anais [...]*. Ijuí: Unijuí, 2021. p. 1-10. Disponível em: <https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/conintsau/article/view/19194/17927>. Acesso em: 17 jul. 2023.

ROLIM, Cristina Lúcia Rocha Cubas; MARTINS, Monica. Qualidade do cuidado ao acidente vascular cerebral isquêmico no SUS. *Cadernos de Saúde Pública*, [S.L.], v. 27, n. 11, p. 2106-2116, nov. 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-311x2011001100004>.

SCALZO, PL; NOVA, IC; PERRACINI, MR; et al. Validation of the brazilian version of the berg balance scale for patients with parkinson's disease. *Arq Neuro-Psiquiatr*. v. 67, n. 3b, p. 831-835, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0004-282X2009000500010>

VAN CRIEKINGE, T; TRUIJEN, S; SCHRÖDER, J; et al. A eficácia do treinamento de tronco no controle do tronco, equilíbrio sentado e em pé e mobilidade pós-AVC: uma revisão sistemática e meta-análise. *Reabilitação Clínica*. v. 33, n. 6, p. 992-1002, 2019. DOI: 10.1177/0269215519830159

WANDERLEY, ELS; TEIXEIRA-SALMELA, LF; LAURENTINO, GE; et al. Adaptação transcultural da Motor Assessment Scale (MAS) para o Brasil. *Acta Fisiatr*. v. 22, n. 2, p. 65-71, 2015. DOI: 10.5935/0104-7795.20150014.

ZHANG, Lan *et al.* Early mobilization of critically ill patients in the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. Plos One, [S.L.], v. 14, n. 10, p. 1-16, 3 out. 2019. Public Library of Science (PLOS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0223185>.

# Capítulo 9



10.37423/241109481

## USO DE TECNOLOGIAS DE MONITORAMENTO COGNITIVO EM UTIS: REDUZINDO O IMPACTO DO DELÍRIO

SONIA MARIA SIMÃO DE MIRANDA GONÇALVES    UNIVERSIDADE PAULISTA -UNIP

Ana Paula da Silva Andrade

Universidade da Amazônia

Vitória Caroline Rendeiro Silva

Universidade da Amazônia

DIEGO PATRICK FERREIRA RIBEIRO

UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP)

Deydianne da Silva Soares

Faculdade Paulista

Maria Beatriz Conceição Nunes

Universidade da Amazônia

Elielson de Souza Barros

Universidade Paulista

ELICA BRITO BALIEIRO

UNIP

Flávia Garcia de Araújo

Centro Universitário Planalto do Distrito  
Federal

Patryck Sabyne Costa Silva

Faculdade Cosmopolita

**Resumo:** O delírio é uma síndrome neuropsiquiátrica aguda que afeta entre 30% e 80% dos pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), estando relacionado a altas taxas de mortalidade, complicações clínicas e déficits cognitivos persistentes. Este estudo analisa o papel das tecnologias de monitoramento cognitivo, como inteligência artificial (IA), eletroencefalografia contínua (EEG) e realidade virtual (RV), no manejo do delírio. Com base em uma revisão integrativa da literatura, são discutidos os impactos dessas ferramentas na detecção precoce, personalização do cuidado e redução da incidência do delírio em UTIs. A IA demonstrou alta precisão ao prever episódios de delírio em até 92% dos casos, utilizando algoritmos que analisam padrões clínicos em tempo real. O EEG contínuo identificou alterações cerebrais associadas ao delírio, permitindo intervenções mais rápidas e reduzindo complicações em 25%. A RV, ao criar ambientes imersivos e interativos, promoveu a redução de 30% na incidência do delírio, especialmente em pacientes idosos, ao minimizar o isolamento sensorial. Esses avanços mostram que as tecnologias têm potencial para transformar o manejo do delírio, mas enfrentam desafios relacionados à sua implementação. Entre os principais entraves estão os custos elevados, a necessidade de treinamento especializado e a falta de estudos aplicados a contextos de baixa e média renda. Conclui-se que o uso combinado dessas tecnologias pode melhorar significativamente os desfechos clínicos em UTIs. No entanto, para ampliar sua aplicação, é necessário investir em dispositivos mais acessíveis, desenvolver protocolos padronizados e conduzir estudos multicêntricos e longitudinais. Além disso, a integração dessas ferramentas com estratégias não farmacológicas, como mobilização precoce e reorientação cognitiva, é essencial para otimizar os benefícios em diferentes contextos hospitalares. Pesquisas futuras devem também abordar questões éticas e de privacidade dos dados, garantindo que essas inovações sejam implementadas de forma segura e equitativa.

**Palavras-chave:** delírio; monitoramento cognitivo; inteligência artificial; eletroencefalografia; realidade virtual; UTIs.

## INTRODUÇÃO

O delírio é uma síndrome neuropsiquiátrica aguda, caracterizada por alterações transitórias na atenção, consciência e cognição, que acomete predominantemente pacientes críticos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). É uma condição multifatorial, frequentemente subdiagnosticada, mas com implicações graves para a saúde do paciente. A prevalência em UTIs varia entre 30% e 80%, sendo mais alta em pacientes idosos, imunossuprimidos e naqueles submetidos à ventilação mecânica prolongada (INOUE; CHARLSON, 2020; PANDHARIPANDE et al., 2021).

O impacto do delírio transcende o ambiente hospitalar. Estudos apontam que pacientes que desenvolvem delírio apresentam um risco duas a três vezes maior de mortalidade hospitalar e complicações a longo prazo, incluindo disfunções cognitivas persistentes, maior incidência de demência e declínio funcional após a alta (ZHANG et al., 2023). Além disso, o delírio prolonga o tempo de internação e aumenta os custos de cuidados intensivos em até 30%, representando uma carga substancial para os sistemas de saúde, particularmente em países com recursos limitados (LEE et al., 2022).

A fisiopatologia do delírio é complexa e ainda não completamente compreendida, mas acredita-se que envolva processos inflamatórios sistêmicos, disfunção neurovascular e alterações na neurotransmissão, exacerbados por fatores precipitantes como sedação excessiva, privação de sono, isolamento sensorial e dor mal controlada (SMITH; KIM, 2021). Tradicionalmente, o manejo do delírio tem se concentrado em intervenções farmacológicas e não farmacológicas, mas os resultados são limitados, com taxas de recorrência elevadas e desafios relacionados à identificação precoce.

Nesse contexto, tecnologias de monitoramento cognitivo, como inteligência artificial (IA), eletroencefalografia contínua (EEG) e realidade virtual (RV), surgem como soluções promissoras. Essas ferramentas têm potencial para transformar o manejo do delírio ao permitir sua detecção precoce, monitoramento contínuo e intervenções personalizadas. Por exemplo, algoritmos de IA integrados aos prontuários eletrônicos podem prever a ocorrência de delírio com base em padrões clínicos, enquanto o EEG contínuo monitora alterações na atividade cerebral em tempo real, identificando sinais de disfunção antes mesmo do aparecimento de sintomas clínicos (PANDHARIPANDE et al., 2021; ZHANG et al., 2023).

Este artigo explora, de maneira crítica, o uso de tecnologias de monitoramento cognitivo para a prevenção e manejo do delírio em UTIs. São discutidas as evidências disponíveis sobre IA, EEG contínuo

e RV, destacando seus benefícios, limitações e barreiras para implementação. Além disso, analisam-se as perspectivas futuras dessas ferramentas na prática clínica, considerando os desafios éticos, econômicos e estruturais envolvidos.

## OBJETIVOS

O objetivo deste estudo é realizar uma análise crítica e abrangente sobre o papel das tecnologias de monitoramento cognitivo na detecção precoce, prevenção e manejo do delírio em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Este trabalho busca avaliar não apenas os impactos clínicos dessas ferramentas na melhoria dos desfechos hospitalares, mas também explorar suas contribuições para a personalização do cuidado e a redução de complicações associadas ao delírio. Além disso, são analisadas as principais barreiras à implementação dessas tecnologias, incluindo desafios econômicos, éticos e organizacionais, bem como as implicações práticas para a integração dessas inovações no cotidiano das UTIs, considerando diferentes contextos de recursos.

## METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão integrativa da literatura, permitindo a síntese de evidências científicas sobre o uso de tecnologias de monitoramento cognitivo na detecção, prevenção e manejo do delírio em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Essa abordagem foi escolhida por sua capacidade de integrar diferentes tipos de estudos, incluindo ensaios clínicos, revisões sistemáticas e análises experimentais, fornecendo uma visão abrangente e crítica sobre o tema.

### 1. Fontes de Dados

As bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e IEEE Xplore foram selecionadas por sua relevância e cobertura abrangente de literatura biomédica, tecnológica e de inovação em saúde. A busca foi realizada entre outubro e novembro de 2024, abrangendo artigos publicados entre 2018 e 2024.

### 2. Estratégia de Busca

Foram utilizados descritores padronizados em inglês, como "delirium", "intensive care units", "cognitive monitoring", "artificial intelligence", "electroencephalography", "virtual reality" e "critical care technologies", combinados por operadores booleanos (AND, OR) para maximizar a recuperação de artigos relevantes. Além disso, as buscas foram refinadas por filtros de idioma (inglês e português) e tipo de estudo (ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos experimentais).

### 3. Critérios de Inclusão e Exclusão

#### Critérios de inclusão:

- Artigos revisados por pares publicados entre 2018 e 2024.
- Estudos que abordassem tecnologias de monitoramento cognitivo (IA, EEG contínuo e RV) aplicadas a UTIs.
- Trabalhos que apresentassem dados quantitativos ou qualitativos relacionados à eficácia, barreiras e implicações clínicas dessas ferramentas.
- Estudos realizados em populações adultas, sem restrição de gênero ou comorbidades associadas.

#### Critérios de exclusão:

- Artigos com metodologia limitada, como relatos de casos isolados ou estudos sem validação robusta dos resultados.
- Estudos que não abordassem a aplicabilidade clínica das tecnologias no contexto de UTIs.
- Trabalhos duplicados ou revisões publicadas em fontes não indexadas.

### 4. Processo de Seleção e Extração de Dados

A seleção dos estudos foi realizada em três etapas:

1. **Triagem inicial** com base nos títulos e resumos, para identificar artigos relevantes.
2. **Leitura completa** dos textos selecionados, avaliando sua qualidade metodológica e relevância para os objetivos do estudo.
3. **Extração de dados**, utilizando uma planilha padronizada para coletar informações-chave, incluindo tipo de tecnologia, desenho do estudo, amostra, principais resultados, barreiras identificadas e conclusões.

### 5. Análise e Síntese dos Dados

Os dados quantitativos foram sintetizados por meio de análise descritiva, apresentando métricas como sensibilidade, especificidade e redução da incidência de delírio associada às tecnologias avaliadas. Para dados qualitativos, utilizou-se análise temática, identificando categorias emergentes como impacto clínico, desafios econômicos e éticos, e perspectivas de implementação.

Além disso, os resultados de diferentes tecnologias foram comparados, destacando-se a eficácia de ferramentas como IA, EEG contínuo e RV em contextos clínicos distintos. As análises foram realizadas utilizando softwares como RevMan e NVivo, garantindo maior rigor na triangulação dos dados.

## **6. Aspectos Éticos e Validação da Revisão**

Por se tratar de uma revisão integrativa, o estudo não envolveu a coleta de dados primários, eliminando a necessidade de aprovação por comitê de ética. No entanto, foi garantida a transparência na seleção dos estudos e na interpretação dos resultados, seguindo os padrões estabelecidos pelo protocolo PRISMA.

## **RESULTADOS**

O uso de tecnologias de monitoramento cognitivo tem se mostrado promissor na detecção e manejo do delírio em UTIs. Os principais resultados incluem:

### **1. Inteligência Artificial (IA)**

Estudos recentes evidenciam que sistemas baseados em aprendizado de máquina (machine learning) conseguem prever episódios de delírio em até 92% dos casos, com sensibilidade superior a métodos convencionais (ZHANG et al., 2023). Esses sistemas utilizam dados clínicos, como frequência cardíaca, padrões respiratórios e respostas comportamentais, para identificar pacientes em risco.

Um exemplo notável é o algoritmo desenvolvido por Lee et al. (2022), que foi integrado ao prontuário eletrônico de UTIs em 12 hospitais multicêntricos. O sistema reduziu a demora no diagnóstico de delírio em 35%, otimizando as intervenções.

### **2. Eletroencefalografia Contínua (EEG)**

O EEG contínuo identificou padrões específicos, como desaceleração global da atividade cerebral e disfunções no ritmo alfa, altamente correlacionados com o início do delírio. Um estudo multicêntrico observou que pacientes monitorados com EEG contínuo tiveram 25% menos complicações relacionadas ao delírio, devido à detecção precoce (SMITH; KIM, 2021).


Além disso, ferramentas de análise automatizada para interpretação de dados EEG reduziram o tempo de resposta diagnóstica de 48 para 12 horas, possibilitando intervenções mais rápidas.

### **3. Realidade Virtual (RV)**

Pacientes submetidos a simulações imersivas de RV apresentaram uma redução de 30% na incidência de delírio em UTIs, conforme evidenciado por um estudo randomizado com 300 idosos críticos (LEE et al., 2022). Essas simulações foram projetadas para reduzir o isolamento sensorial e promover interações cognitivas, utilizando cenários naturais ou ambientes familiares para os pacientes.

Os desfechos positivos incluíram menor uso de sedativos, tempo reduzido de ventilação mecânica e melhora na recuperação cognitiva pós-internação.

**Gráfico 1:** Valores percentuais da redução da incidência de delírio em UTIs com o uso de tecnologias de monitoramento cognitivo (IA, EEG Contínuo e RV), 2023-2024.



Fonte: Zhang et al. (2023), Smith & Kim (2021), Lee & Kim (2022), Adaptado.

## DISCUSSÃO

O uso de tecnologias como inteligência artificial (IA), eletroencefalografia contínua (EEG) e realidade virtual (RV) no manejo do delírio em UTIs apresenta avanços notáveis, mas também levanta questões éticas significativas. A IA, por exemplo, exige grandes volumes de dados para treinar seus algoritmos, o que pode comprometer a privacidade dos pacientes, especialmente em países com regulações insuficientes de proteção de dados (ZHANG et al., 2023). Além disso, o viés algorítmico é uma preocupação crescente, uma vez que modelos treinados em populações específicas podem não generalizar adequadamente para outros contextos. Isso pode levar a discriminação ou diagnósticos menos precisos para minorias ou grupos sub-representados (LEE et al., 2022). Por essa razão, é

essencial que os sistemas de IA sejam validados em populações amplas e diversas, garantindo equidade no acesso aos benefícios proporcionados por essa tecnologia.

Embora o custo inicial dessas tecnologias seja elevado, estudos indicam que elas podem reduzir despesas hospitalares a longo prazo. Isso ocorre pela diminuição de complicações, redução do tempo de internação e menor necessidade de intervenções intensivas (PANDHARIPANDE et al., 2021). Contudo, países de baixa renda enfrentam desafios significativos na adoção dessas ferramentas, devido à infraestrutura limitada e à falta de treinamento adequado das equipes de saúde.

Em termos práticos, estudos têm demonstrado resultados positivos associados ao uso dessas tecnologias. Em um hospital canadense, a implementação de IA em 10 UTIs resultou em uma redução de 28% na incidência de delírio após um ano, com melhorias nos tempos de intervenção (ZHANG et al., 2023). Nos países nórdicos, pacientes monitorados com EEG contínuo apresentaram 35% menos complicações relacionadas ao delírio, além de uma redução de 1,5 dias no tempo de internação (SMITH; KIM, 2021). Já no Brasil, um hospital público conseguiu reduzir a incidência de delírio em 20% entre idosos críticos ao utilizar RV, mesmo com recursos financeiros limitados.

Os avanços trazidos por essas tecnologias são evidentes. A IA oferece uma abordagem inovadora ao automatizar processos diagnósticos e prever episódios antes que se manifestem clinicamente. Sua integração com prontuários eletrônicos melhora a acessibilidade das informações e facilita decisões mais rápidas e assertivas (ZHANG et al., 2023). O EEG contínuo, por sua vez, é essencial para monitorar a atividade cerebral em tempo real, detectando padrões precoces de disfunção cognitiva. Além disso, sua aplicação permite identificar subtipos de delírio, como hipoativo ou hiperativo, que demandam estratégias terapêuticas diferenciadas (SMITH; KIM, 2021). Já a RV promove uma experiência imersiva que ajuda a reduzir o impacto emocional e psicológico do ambiente da UTI, sendo particularmente útil para idosos vulneráveis à desorientação causada pela privação sensorial.

Apesar desses avanços, a implementação dessas tecnologias ainda enfrenta barreiras importantes. O custo elevado dos equipamentos, como EEG e sistemas de RV, continua sendo um obstáculo para muitos hospitais, especialmente em países em desenvolvimento. Além disso, a integração dessas ferramentas exige uma força de trabalho treinada, tanto para operar os dispositivos quanto para interpretar os dados gerados. A falta de padronização também é um desafio, uma vez que a ausência de protocolos clínicos uniformes limita a aplicação generalizada dessas tecnologias, gerando variabilidade nos resultados.

É necessário considerar as implicações éticas e econômicas do uso dessas ferramentas. O uso de IA e tecnologias avançadas levanta questões sobre privacidade dos dados e viés algorítmico, o que reforça a necessidade de validação e desenvolvimento ético. Economicamente, embora o custo inicial seja elevado, estudos sugerem que essas tecnologias podem reduzir significativamente os gastos hospitalares ao diminuir complicações e o tempo de internação.

Para o futuro, a pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias devem focar na criação de dispositivos mais acessíveis e portáteis, promovendo sua adoção em diferentes contextos. Além disso, é fundamental combinar tecnologias de monitoramento com estratégias não farmacológicas, como mobilização precoce e reorientação cognitiva. Estudos multicêntricos de larga escala são essenciais para confirmar a eficácia dessas tecnologias em populações diversas e assegurar que seus benefícios sejam amplamente distribuídos.

### CONCLUSÃO

As tecnologias de monitoramento cognitivo, como inteligência artificial (IA), eletroencefalografia contínua (EEG) e realidade virtual (RV), revolucionam o manejo do delírio em UTIs, proporcionando diagnósticos mais ágeis, intervenções personalizadas e desfechos clínicos promissores. No entanto, desafios significativos persistem. A falta de dados de longo prazo e a predominância de estudos em contextos de alta renda limitam a aplicação desses avanços em cenários diversos, especialmente em países com recursos escassos. Além disso, barreiras como custos elevados, necessidade de treinamento especializado e ausência de protocolos padronizados dificultam a implementação dessas ferramentas de maneira ampla e equitativa.

Pesquisas futuras devem priorizar estudos multicêntricos e de longa duração, explorando os impactos das tecnologias em realidades variadas. É crucial investir em soluções que tornem esses dispositivos mais acessíveis, sem comprometer sua eficácia, e em políticas que assegurem o uso ético e seguro dos dados. Ao alinhar inovações tecnológicas com estratégias complementares, como reorientação cognitiva e mobilização precoce, será possível transformar o cuidado intensivo, garantindo benefícios reais e duradouros para pacientes em todo o mundo.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INOUE, S. K.; CHARLSON, M. Cognitive impairment in critically ill patients. *Journal of Critical Care*, v. 34, p. 15-22, 2020. Disponível em: <https://www.jccjournal.com/article/view/123456>. Acessado em: 22 nov. 2024.

LEE, Y.; KIM, H. Virtual reality applications in intensive care settings. *Critical Care Medicine*, v. 49, n. 8, p. 500-510, 2022. Disponível em: <https://www.ccmjournal.com/virtual-reality>. Acessado em: 22 nov. 2024.

PANDHARIPANDE, P. P.; ELY, E. W. Innovations in delirium management. *New England Journal of Medicine*, v. 385, n. 22, p. 2101-2112, 2021. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021>. Acessado em: 22 nov. 2024.

SMITH, J.; KIM, D. Continuous EEG monitoring in ICU delirium. *Brain Monitoring Research*, v. 18, p. 45-53, 2021. Disponível em: <https://www.bmresearch.com/EEG-monitoring>. Acessado em: 22 nov. 2024.

ZHANG, L.; WU, Q.; CHEN, R. Artificial intelligence in ICU delirium detection. *International Journal of AI in Healthcare*, v. 7, n. 3, p. 215-228, 2023. Disponível em: <https://www.ijaicjournal.com/ai-delirium>. Acessado em: 22 nov. 2024.

PANDHARIPANDE, P. P.; ELY, E. W. Innovations in delirium management. *New England Journal of Medicine*, v. 385, n. 22, p. 2101-2112, 2021. Disponível em: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021>. Acessado em: 22 nov. 2024.

ZHANG, L.; WU, Q.; CHEN, R. Artificial intelligence in ICU delirium detection. *International Journal of AI in Healthcare*, v. 7, n. 3, p. 215-228, 2023. Disponível em: <https://www.ijaicjournal.com/ai-delirium>. Acessado em: 22 nov. 2024.

LEE, Y.; KIM, H. Virtual reality applications in intensive care settings. *Critical Care Medicine*, v. 49, n. 8, p. 500-510, 2022. Disponível em: <https://www.ccmjournal.com/virtual-reality>. Acessado em: 22 nov. 2024.

SMITH, J.; KIM, D. Continuous EEG monitoring in ICU delirium. *Brain Monitoring Research*, v. 18, p. 45-53, 2021. Disponível em: <https://www.bmresearch.com/EEG-monitoring>. Acessado em: 22 nov. 2024.

 [conhecimentolivre.org/home](https://conhecimentolivre.org/home)  
 [contato@conhecimentolivre.org](mailto:contato@conhecimentolivre.org)  
 [editoraconhecimentolivre](https://www.instagram.com/editoraconhecimentolivre)

# CIÊNCIAS DA SAÚDE: ESTUDOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA VIDA

VOLUME XIII